

## Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 5. Coleoptera (2018–2024)

Stanislav Benedikt<sup>1</sup>, Václav Benedikt<sup>2</sup>, Václav Dongres<sup>3</sup>, Libor Dvořák<sup>4</sup>, Tomáš Fiala<sup>5</sup>, Jiří Hejkal<sup>6</sup>, Ferdinand Holly<sup>7</sup>, Petr Kresl<sup>8</sup>, Jiří Lahoda<sup>9</sup>, Michal Ouda<sup>10</sup>, Arnošt Sieber<sup>11</sup>, Petr Sladký<sup>12</sup>, Anna Šístková<sup>13</sup>, Václav Týr<sup>14</sup>, Stanislav Vodička<sup>15</sup> & Jan Walter<sup>16</sup>

<sup>1</sup>Částkova 10, CZ-326 00 Plzeň; e-mail: sbenedikt@seznam.cz

<sup>2</sup>Koterovská 78, CZ-326 00 Plzeň; e-mail: benedikt.va@seznam.cz

<sup>3</sup>Toužimská 12, CZ-323 34 Plzeň; e-mail: v.dongres@seznam.cz

<sup>4</sup>Trži Sekery 21, CZ-353 01 Mariánské Lázně; e-mail: lib.dvorak@seznam.cz

<sup>5</sup>Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Zemědělská 1665/1, CZ-613 00 Brno; e-mail: tomas.fiala@aopk.gov.cz

<sup>6</sup>Kpt. Jaroše 213, CZ-358 01 Kraslice; e-mail: amara@volny.cz

<sup>7</sup>Kyselka 164, CZ-362 72 Kyselka; e-mail: Holly.F@seznam.cz

<sup>8</sup>Spüle 7, CZ-340 21 Janovice nad Úhlavou; e-mail: petr.kresl@seznam.cz

<sup>9</sup>Chrastavice 89, CZ-344 01 Domažlice; e-mail: j.lahoda@centrum.cz

<sup>10</sup>Ke Štěpnici 563, CZ-331 01, Plasy; e-mail: michalouda@seznam.cz

<sup>11</sup>Sídlíště U Pošty 671/III, CZ-339 01 Klatovy; e-mail: asieber@seznam.cz

<sup>12</sup>Pec 40, CZ-344 01 Domažlice; e-mail: psladky1042@seznam.cz

<sup>13</sup>Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: anniesistkova@seznam.cz

<sup>14</sup>Žihle 119, CZ-331 65; Žihle; e-mail: onthophagus@seznam.cz

<sup>15</sup>Trnová 213, CZ-330 13; e-mail: stan.vodicka@seznam.cz

<sup>16</sup>Západočeské muzeum v Plzni, Zoologické oddělení, Kopeckého sady 2, CZ-301 00 Plzeň; e-mail: jwalter@zcm.cz

BENEDIKT S., BENEDIKT V., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., HEJKAL J., HOLLY F., KRESL P., LAHODA J., OUDA M., SIEBER A., SLADKÝ P., ŠÍSTKOVÁ A., TÝR V., VODIČKA S. & WALTER J. 2025: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 5. Coleoptera (2018–2024). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 5. Coleoptera (2018–2024)). *Západočeské entomologické listy* 16: 71–88, 27-11-2025.

**Abstract.** Selected findings of 105 beetle species (Coleoptera) considered rare, threatened or faunistically remarkable, recorded in the region of western Bohemia in the years 2018–2024, are presented in the paper. Short notes on the distribution and bionomical preferences of certain species are given and collecting circumstances are also discussed. Several species are reported as new for the territory of western Bohemia, namely *Ampedus melanurus* Mulsant & Guillebeau, 1855, *Bledius pallipes* (Gravenhorst, 1806), *Calodera uliginosa* Erichson, 1837, *Ceutorhynchus posthumus* Germar, 1824, *Foucارتia squamulata* (Herbst, 1795), *Helophorus asperatus* Rey, 1885, *Kateretes rufilabris* (Latreille, 1807), *Limnebius atomus* (Duftschmid, 1805), *Mordellistena kraatzi* Emery, 1876, *Ochthebius pusillus* Stephens, 1835, *Quedius infuscatus* Erichson, 1840 and *Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777).

**Key words:** faunistics, Czechia, new records

### ÚVOD

Předkládaný příspěvek tematicky navazuje na práce zveřejněné v časopisu Západočeské entomologické listy v minulých letech (BENEDIKT et al. 2021, 2022b, 2023, 2024). Jeho záměrem je zveřejnění informací o nálezech brouků (Coleoptera) pozoruhodných z hlediska jejich vzácnosti v regionu západních Čech, případně jejich ohrožení v rámci Česka. Pátý díl zahrnuje nálezy učiněné převážně v roce 2024,

uvádí ale i několik jednotlivých údajů z let předchozích, od roku 2018, které se neobjevily v minulých příspěvcích.

### METODIKA

Nálezy byly učiněny v rámci příležitostných i systematických faunistických průzkumů na území krajů Plzeňského a Karlovarského v letech 2018–2024. V příspěvku uvedená nomenklatura je převzata

z jednotlivých dílů palearktického katalogu (LÖBL & SMETANA 2007, LÖBL & LÖBL 2015, 2016, 2017, DANILEVSKY 2020, IWAN & LÖBL 2020), pouze nejsou uvedeny nominotypické poddruhy. Nosatcovití brouci (Curculionoidea) jsou zpracováni dle ALONSO-ZARAZAGA et al. (2023). Taxony jsou na všech úrovních pro větší přehlednost řazeny abecedně. Za jménem druhu je případně doplněna zkratka stupně ohrožení druhu, který je převzatý z červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR (HEJDA et al. 2017). Lokality jsou řazeny vzestupně podle kódů faunistických mapových polí a v rámci příslušného kódu pak abecedně. Za názvem lokality je v závorce uveden kód faunistického mapového pole, které bylo určeno nástrojem pro výpočet mapovacích polí (BIOLIB 1999–2023). Kde bylo možno, jsou doplněny souřadnice, upřesňující místo nálezu, a případně i nadmořská výška. Jednotlivé záznamy nejsou většinou dále komentovány a jsou uvedeny jako prosté nálezové údaje. Komentáře jsou doplněny jen u druhů kriticky ohrožených (CR) dle HEJDA et al. (2017) a dále u nálezů, kde je autoři považovali za přínosné.

#### Použité zkratky:

coll. – sbírka s uložením dokladů, det. – určil, jr. – junior, lgt. – sbíral, observ. – pozoroval, revid. – revidoval, ex. – exemplář/-e  
CHKO – chráněná krajinná oblast, EVL – evropsky významná lokalita, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, č. p. – číslo popisné, env. – okolí, intr. – intravilán  
CR – kriticky ohrožený druh, DD – nedostatečné údaje, EN – ohrožený druh, NT – téměř ohrožený druh, VU – zranitelný druh  
ZČM – Západočeské muzeum v Plzni  
Všeobecně zařazené zkratky pro orientaci podle světových stran ponecháváme bez vysvětlení.

### PŘEHLED NÁLEZŮ

#### ANTHICIDAE

##### *Cordicomus gracilis* (Panzer, 1796)

Bohemia occ., Plzeň-Bolevec (6246), rybník Košinář, 49°46'52"N 13°24'03"E, 21.VII.2021, 6 ex., smyk pobřežního porostu, V. Dongres lgt., det. et coll. Další nálezy tohoto v západních Čechách řídce zjišťovaného druhu s preferencí rákosin (BENEDIKT et al. 2021, 2024).

#### ATTELABIDAE

##### *Caenorhinus megacephalus* (Germar, 1823)

Bohemia occ., Břetislav (6845), údolí řeky Úhlavy, 49°11'27"N 13°12'46"E, 14.VII.2024, 5 ex. (více ex.

observ.), oklep osluněných bříz (*Betula* sp.) vysokých asi do 3 m, P. Kresl lgt., det. et coll.

Arborikolní druh s vazbou na břízy (*Betula* spp.), který je v západních Čechách známý jen lokálně ze středních a vyšších poloh (např. KEJVAL & BENEDIKT 2009).

#### BOSTRICHIDAE

##### *Lyctus brunneus* Stephens, 1830

Bohemia occ., Plzeň-Radčice (6245), niva Mže, 49°45'34"N 13°19'22"E, 2.VI.2020, 5 ex., na kmenu vrby (*Salix* sp.), V. Dongres lgt., det. et coll.

##### *Rhyzopertha dominica* (Fabricius, 1792)

Bohemia occ., Hrad Nečtiny (6044), č. p. 31, 49°57'20"N 13°09'22"E, 17.VIII.2024, 1 ex., synantropně, M. Ouda lgt., det. et coll.

Druhý doklad ze západních Čech tohoto do Evropy introdukovaného druhu, který zde zdomácněl a vyskytuje se jak v antropogenním, tak i přírodním prostředí (viz také BENEDIKT et al. 2023).

#### BRENTIDAE

##### *Oxystoma ochropus* (Germar, 1818)

Bohemia occ., Branišov, 1 km sv. (6044), Blažejský rybník, 49°59'54"N 13°00'55"E, 600 m n. m., 16.V.2024, 2 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.



Obr./Fig. 1. *Squamapion vicinum*. Bohemia: Dobrá Voda. Foto/Photo: S. Benedikt.

***Squamapion vicinum*** (Kirby, 1808) NT (Obr. 1)  
Bohemia occ., Dobrá Voda, 2 km jz. (6043), rybník U Křížku, 49°58'40"N 12°56'36"E, 660 m n. m., 29.VII.2024, 1 ex., smyk pobřežního mokřadu, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Vzácný druh mokřadních stanovišť s vazbou na máty (*Mentha* spp.). Recentní nálezy ze západních Čech publikovali např. KEJVAL et al. (2008) a OUDA (2019).

## BUGRETI

***Anthaxia candens*** (Panzer, 1787) EN  
Bohemia occ., Chrančovice (6144), 49°50'32"N 13°09'02"E, 9.IV.2023, 1 ex., v kmenu staré třešně (*Prunus* sp.), V. Dongres lgt., det. et coll.

***Anthaxia chevrieri*** Gory & Laporte, 1839 EN  
Bohemia occ., Liblín, 1 km v. (6047), skalní vyhlídka, 49°55'10"N 13°33'25"E, 345 m n. m., 16.VI.2024, 4 ex., na květech janovce metlatého (*Cytisus scoparius*), V. Týr lgt., det. et coll.  
Teprve druhý doložený výskyt druhu ze západních Čech (viz BENEDIKT et al. 2021).

## BEVŘEČI

***Acupalpus exiguus*** Dejean, 1829  
Bohemia occ., Teplá-Šafařské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 20.III.2024, 1 ex., náplav, S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.  
V západních Čechách dosud jen ojediněle zjištěný mokřadní druh (např. BENEDIKT et al. 2022b).

***Bembidion humerale*** Sturm, 1825  
Bohemia occ., Teplá-Šafařské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 20.III.2024, 1 ex., náplav, S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.  
V západních Čechách lokální druh s výskytem na okrajích kyselých, často zrašelinělých mokřadů (např. KEJVAL et al. 2008).

***Blemus discus*** (Fabricius, 1792)  
Bohemia occ., Dolní Hradiště (6046), EVL Kaňon Střely, 49°54'46"N 13°28'40"E, 9.VII.2024, 1 ex., odchyt na světlo, M. Ouda lgt. et coll., J. Hejkal det.

***Carabus cancellatus*** Illiger, 1798 NT  
Bohemia occ., Jindřichovice-Háj (5741), 0,8 km sz. obecní části Háj, 50°15'27"N 12°35'36"E, 700 m n. m., 1.V.2024, 1 ex., okraj pole; Jindřichovice-Háj (5741), 0,5 km j. obecní části Háj, 50°14'51"N 12°36'19"E, 640–650 m n. m., 29.IX.2024, 1 ex., listnatý les nad potokem, ztrouchnivělý pařez; oba

ex. J. Hejkal lgt., det. et coll.

V minulém století široce rozšířený a hojný druh, častý na polích. V současné době je nalézán již jen sporadicky od nížin do středních horských poloh. V mnoha oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou nyní zcela chybí nebo je vzácný (např. VONIČKA et al. 2022). Zařazení českých populací do poddruhů je v posledních letech nejednotné, územně nevyjasněné a stanovení výskytu poddruhů v Česku vyžaduje revizi.

***Cymindis angularis*** Gyllenhal, 1810  
Bohemia occ., Dobřany (6345), PP Šlovický vrch, 49°39'52"N 13°18'45"E, 24.X.2023, 4 ex., I. Hradská lgt., S. Vodička det., coll. ZČM.  
V současnosti v západních Čechách už jen vzácně zjištěný xerothermní druh, dříve doložený z více lokalit širšího Plzeňska a okolí Kamence u Radnic (S. Benedikt, nepublikované údaje).

***Cymindis humeralis*** (Fourcroy, 1785) (Obr. 2)  
Bohemia occ., Dobřany (6345), PP Šlovický vrch, 49°39'53"N 13°18'49"E, 10.VIII.2023, 1 ex., I. Hradská lgt., S. Vodička det., coll. ZČM.  
Druh suchých kamenitých biotopů včetně zachova-



Obr./Fig. 2. *Cymindis humeralis*. Bohemia: PP Šlovický vrch. Foto/Photo: J. Walter.



lých pastvin. Na uvedené lokalitě je realizována pastva exmoorských koní, která se zdá být pro výskyt xerothermních druhů prospěšná. Před zavedením pastvy v roce 2018 nebyl druh na lokalitě zjištěn (WALTER et al. 2025). Historicky je uváděn např. z roku 1978 z Březového vrchu u Dobřan (BUCHTOVÁ 2025).

***Leistus rufomarginatus*** (Duftschmid, 1812)

Bohemia occ., Jindřichovice-Háj (5741), 0,5 km j. obecní části Háj, 50°14'51"N 12°36'19"E, 640–650 m n. m., 29.IX.2024, 1 ex., listnatý les nad potokem; dtto, 3.–7.X.2024, 1 ex., zemní past, oba ex. J. Hejkal lgt., det. et coll.; dtto, 7.–11.X.2024, 2 ex., zemní past, J. Hejkal lgt. et det., coll. J. Hejkal et J. Pávek; Nekmír (6145), PR Bažantnice, 49°51'50"N 13°15'23"E, 23.X.2024, 1 ex., zemní past, J. Walter lgt., S. Vodička det., coll. ZČM.

Další nálezy v současnosti expandujícího lesního druhu, který byl v západních Čechách poprvé zjištěn v roce 2023 na území Českého lesa (BENEDIKT et al. 2024, WALTER et al. 2024), v intravilánu Plzně (ZRUBCOVÁ 2024) a v PP Šlovický vrch u Dobřan (WALTER et al. 2025).

***Ocys quinquestriatus*** (Gyllenhal, 1810)

Bohemia occ., Plzeň (6246), Denisovo nábřeží, 49°44'37"N 13°22'51"E, 17.VIII.2021, 1 ex., kartónová past na vzrostlém platanu, O. Vaněk lgt., det. et coll., S. Vodička revid.

Druh s vazbou převážně na synantropní stanoviště, jako jsou rumiště, staré sklepy, vlhké sutě apod. Uvedený exemplář byl zjištěn v rámci výzkumů fauny stromů, rostoucích v okolí centra města Plzeň (VANĚK et al. 2023).

***Ophonus ardosiacus*** (Lutshnik, 1922)

Bohemia occ., Dobřany (6345), PP Šlovický vrch, 49°39'53"N 13°19'13"E, 17.VII.2023, 1 ex.; dtto, 10.VIII.2023, 1 ex., I. Hradská lgt., S. Vodička det., coll. ZČM; Starý Plzenec (6346), vrch Ostrá hůrka, 49°41'56"N 13°26'18"E, 8.VII.2024, 1 ex., světelná past; Starý Plzenec (6346), ul. B. Němcové, zahrada, 49°41'31"N 13°28'40"E, 16.VII.2024, 1 ex., světelná past; oba ex. V. Benedikt jr. lgt., V. Benedikt det. et coll.

Semenožravý druh, který je vázán na planou mrkev (*Daucus carota*), a to především na xerothermních lokalitách. V západních Čechách byl poprvé zaznamenán v roce 2010 (VESELÝ et al. 2012), další nálezy odtud publikovali BENEDIKT et al. (2024).

***Ophonus puncticollis*** (Paykull, 1798)

Bohemia occ., Dobřany (6345), PP Šlovický vrch, 49°39'53"N 13°19'13"E, 10.VIII.2023, 1 ex.; dtto, 30.VIII.2023, 1 ex.; vše I. Hradská lgt., S. Vodička

det., coll. ZČM.

Xerothermní druh otevřených biotopů, jako jsou stepi, okraje polí, lomy, kamenité svahy apod. V západních Čechách mizející druh, recentně doložený převážně jen z oblasti Sušicko-horažďovických vápenců (S. Benedikt, nepublikované údaje), vzácněji také ze širšího Plzeňska, např. Březový vrch u Dobřan (1978) (BUCHTOVÁ 2025).

**CERAMBYCIDAE**

***Acanthocinus griseus*** (Fabricius, 1793)

Bohemia occ., Lešišov (6746), 49°15'48"N 13°28'26"E, 27.VII.2024, 1 ex., na světlo při okraji borového lesa, A. Sieber lgt., det. et coll.

***Obrium cantharinum*** (Linnaeus, 1774)

Bohemia occ., Klatovy (6645), lesopark Klatovská Hůrka, 49°23'42"N 13°16'01"E, 15.VII.2024, 1 ex., na světlo při jz. okraji lesa, A. Sieber lgt., det. et coll. V minulosti v Česku poměrně vzácně zjišťovaný druh (viz SLÁMA 1998) je v poslední době častěji nálezaný, a to i v západních Čechách (např. TÝR 2011, BENEDIKT et al. 2023, 2024).

***Plagionotus detritus*** (Linnaeus, 1758)

Bohemia occ., Klatovy (6645), lesopark Klatovská Hůrka, 49°23'42"N 13°16'01"E, 15.VII.2024, 1 ex., na světlo při jz. okraji lesa, A. Sieber lgt., det. et coll.

***Saperda perforata*** (Pallas, 1773)

Bohemia occ., Malechov (6545), vrch Běleč, 49°28'11"N 13°14'30"E, 5.V.2024, 1 ex., osikové dříví (*Populus tremula*), 1 pupa, líhnutí imaga v domácích podmínkách 29.V.2024, A. Sieber lgt., det. et coll.

V západních Čechách vzácný druh s vývojem larev v různých topolech (*Populus* spp.). Publikovaných údajů je odtud známo jen několik (SLÁMA 1998, TÝR 2011, BENEDIKT et al. 2023, 2024).

***Semanotus undatus*** (Linnaeus, 1758) NT

Bohemia bor., Kryry env. (5846), vrch Na Výhledech, 50°10'19"N 13°25'49"E, 380 m n. m., 21.III.2024, 1 ex., v letu, F. Holly lgt., det. et coll.

Z území západních Čech byl druh publikovaný nedávno z nedaleké Žihle (BENEDIKT et al. 2021). Výše uvedená lokalita leží už těsně za hranicemi předmětného území v Ústeckém kraji.

***Stictoleptura scutellata*** (Fabricius, 1781) NT

Bohemia occ., Slatina (6545), Bělýšovský les, 49°27'03"N 13°12'12"E, 11.VII.2024, 1 ex., na duhovém dříví, A. Sieber observ.

## CHRYSOMELIDAE

### *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831)

Bohemia occ., Starý Plzenec (6346), 49°41'30"N 13°28'40"E, 1.XII.2024, 2 ex., V. Benedikt jr. lgt., S. Benedikt det. et coll.

### *Chrysolina haemoptera* (Linnaeus, 1758) EN

Bohemia occ., Plasy-Babiná (6046), 49°56'19"N 13°26'07"E, 23.VIII.2023, 1 ex.; dtto, 3.IX.2023, 1 ex., oba ex. M. Ouda lgt., det. et coll.; Plzeň-Košutka intr. (6245), 49°46'35"N 13°21'43"E, trávník na sídlišti, 5.VI.2024, 1 ex.; dtto, 15.VIII.2024, 1 ex.; oba ex. V. Dongres lgt., det. et coll.

V Česku nehojný druh otevřených trávníků s potravní vazbou na jitrocele (*Plantago* spp.). Městské sečené trávníky s charakterem krátkostébelné stepi mohou pro tento druh představovat vhodné náhradní stanoviště, viz lokalita Plzeň-Košutka. V západních Čechách je znám z početných lokalit, včetně dalších přímo v intravilánu Plzně (poznatky autorů). S ohledem na tyto zkušenosti by bylo vhodné uvažovat o vyřazení druhu z červeného seznamu při jeho další aktualizaci.

### *Cryptocephalus exiguus* Schneider, 1792 EN (Obr. 3)

Bohemia occ., Branišov, 1 km sv. (6044), PP Blažejský rybník, 49°59'54"N 13°00'55"E, 600 m n. m., 21.VI.2024, 4 ex., smyk porostů tužebníku jilmového



Obr./Fig. 3. *Cryptocephalus exiguus*. Bohemia: PP Blažejský rybník. Foto/Photo: S. Benedikt.

(*Filipendula ulmaria*) na rašeliništi, S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll.

V Česku vzácný a lokální druh vlhkých luk. Vývoj je uváděn na krvavci totenu (*Sanguisorba officinalis*). Ze západních Čechách byl dosud publikován pouze ojedinele (např. OUDA 2019), početnější nálezy ale existují např. z oblasti Slavkovského lesa (S. Benedikt, nepublikované údaje).

### *Megabruchidius dorsalis* (Fåhraeus, 1839)

Bohemia occ., Starý Plzenec (6346), 49°41'30"N 13°28'40"E, 1.XII.2024, 1 ex., V. Benedikt jr. lgt., S. Benedikt det. et coll.

Další západočeský nález tohoto invazivního introdukovaného druhu s vývojem v luscích dřezovce trojtrnného (*Gleditsia triacanthos*) (LOVĚTÍNSKÝ et al. 2021).

## CLERIDAE

### *Opilo mollis* (Linnaeus, 1758)

Bohemia occ., Mezihoří (6545), vrch Tuhošť, 49°29'11"N 13°15'45"E, 30.V.2024, 2 ex., oklepem dubu (*Quercus* sp.), A. Sieber observ.

## CUCUJIDAE

### *Pediacus depressus* (Herbst, 1794) VU

Bohemia occ., Chrastavice, 1 km v. (6542), 49°27'35"N 12°57'56"E, 3.VII.2024, 2 ex., v tlejících kmenech jív (*Salix caprea*), J. Lahoda lgt., det. et coll.

## CURCULIONIDAE

### *Bagous collignensis* (Herbst, 1797) VU

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.VIII.2024, 1 ex., mokřad, S. Benedikt lgt., det. et coll.

### *Bagous frit* (Herbst, 1795) EN

Bohemia occ., Branišov, 1 km sv. (6044), PP Blažejský rybník, 49°59'54"N 13°00'55"E, 600 m n. m., 21.VI.2024, 2 ex., smyk porostu vachty trojlisté (*Menyanthes trifoliata*) na rašeliništi, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku vzácný a velmi lokální druh rašelinných lokalit ve středních polohách. V západních Čechách se jedná o teprve třetí známou lokalitu druhu (viz BENEDIKT et al. 2010), která se stejně jako dvě dosavadní nachází na severním Plzeňsku. Další dvě (Podbořánky, Tchořovice) jsou známy těsně za hranicemi předmětného území (BENEDIKT et al. 2021, 2022b, 2023).

***Bagous tempestivus* (Herbst, 1795) NT**

Bohemia occ., Závišín, 1 km sv. (6042), Velký Kolový rybník, 49°59'13"N 12°45'46"E, 720 m n. m., 11.III.2024, 1 ex., prosev pobřežního detritu, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Ceutorhynchus posthumus* Germar, 1824 NT (Obr. 4)**

Bohemia occ., Albeřice, jv. (5844), vrch Albeřická hůrka, 50°09'41"N 13°10'37"E, 630 m n. m., 20.V.2024, 4 ex.; Čichalov env. (5845), 50°07'38"N 13°10'17"E, 600 m n. m., 23.V.2024, 4 ex.; Proti-vec, 1 km s. (5845), vrch Na Karlově, 50°06'39"N 13°12'26"E, 580 m n. m., 23.V.2024, 4 ex.; vždy ve smyku xerothermní louky, S. Benedikt lgt., det. et coll. V Česku je z recentních nálezů známý pouze z podhůří Doupovských hor a z jižní Moravy (S. Benedikt, nepublikované údaje). Pravděpodobně první publikované údaje pro západní Čechy.

***Cyclorhipidion bodoanum* (Reitter, 1913)**

Bohemia occ., Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 500 m n. m., 22.V.2024, 1 ex., zahrada, na čerstvém dubovém palivovém dřevu, V. Týr lgt. et coll., T. Fiala det.; Potín, 1–2 km jv. (6144), údolí Úterského potoka, 49°52'59"N 13°01'35"E, 430 m n. m., 11.IV.2024, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

Původně východoasijský druh kůrovce introdukovaný do Severní Ameriky a Evropy, kde byl poprvé zjištěn ve Francii v roce 1960. První nález v Česku

byl zaznamenán v roce 2020 na vrchu Vladař u Žlutic (FIALA 2021, FIALA et al. 2021).

***Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790) VU**

Bohemia occ., Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 500 m n. m., 15.X.2024, 1 ex., na zdi domu, V. Týr lgt., S. Benedikt det. et coll.

***Dorytomus salicis* Walton, 1851**

Bohemia occ., Závišín, 1 km sv. (6042), Velký Kolový rybník, 49°59'13"N 12°45'46"E, 720 m n. m., 11.III.2024, 2 ex., prosev hrabanky; Branišov, 1 km sv. (6044), PP Blažejský rybník, 49°59'54"N 13°00'55"E, 600 m n. m., 30.I.2024, 3 ex., prosev; vše S. Benedikt det. et coll. (1 ex.).

***Foucartia squamulata* (Herbst, 1795)**

Bohemia occ., Čichalov env. (5845), 50°07'38"N 13°10'17"E, 600 m n. m., 23.V.2024, 1 ex., smyk suché louky, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Teplomilný nosatec, v Česku rozšířený v oblastech termofytika. Zřejmě první doklad druhu z území západních Čech, navíc z poměrně vysoké polohy.

***Gasterocercus depressirostris* (Fabricius, 1792) VU**

Bohemia occ., Dolní Hradiště (6046), EVL Kaňon Střely, 49°54'46"N 13°28'40"E, 9.VII.2024, 1 ex., lov na světlo; Nebřeziny (6046), EVL Kaňon Střely, 49°54'48"N 13°27'23"E, 1 ex., lov na světlo; oba ex. M. Ouda lgt. et coll., S. Benedikt det.

Recentně expandující xylofágní nosatec s noční aktivitou. Výskyt je vázaný na zachovalejší komplexy doubrav. V západních Čechách byl dosud zjištěn pouze jednotlivým nálezem v okolí Plzně v roce 2016 (BENEDIKT et al. 2022a).

***Grypus brunnirostris* (Fabricius, 1792) VU (Obr. 5)**

Bohemia occ., Teplá-Kláster, 1,5 km jz. (6043), niva Teplé pod Betlémským rybníkem, 49°57'20"N 12°51'19"E, 670 m n. m., 7.IV.2024, 4 ex., mokřad, S. Benedikt lgt., det. et coll.; Chotiměř env. (6444), okolí potoka Zubřina, 49°30'30"N 13°01'41"E, 370 m n. m., 21.V.2024, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

V Česku vzácný a lokální druh vlhkých luk s potravní vazbou na přesličky (*Equisetum* spp.). V západních Čechách je známý jen z ojedinělých nálezů (např. BENEDIKT et al. 2021).

***Hypera contaminata* (Herbst, 1795) NT**

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.V.2024, 1 ex., mokřad, S. Benedikt lgt., det. et coll.



Obr./Fig. 4. *Ceutorhynchus posthumus*. Bohemia: Proti-vec. Foto/Photo: S. Benedikt.



***Lixus ochraceus* Boheman, 1842 VU**

Bohemia occ., Teplá-Šafářské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 22.III.2024, 1 ex., náplav, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Pozoruhodný nález tohoto teplomilného nosatce s vazbou na rostliny čeledi Brassicaceae na mokřadní lokalitě v poměrně vysoké poloze, který může být dokladem současné expanze druhu.

***Lixus paraplecticus* (Linnaeus, 1758) EN**

Bohemia occ., Teplá-Šafářské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 31.VII.2024, 1 ex., na haluše vodní (*Oenanthe aquatica*), S. Benedikt lgt., det. et coll.

Další lokalita tohoto hygrofilního nosatce s vazbou na haluchu vodní (*Oenanthe aquatica*) ve vyšších polohách Tepelské plošiny (BENEDIKT et al. 2022b).

***Lixus punctiventris* Boheman, 1835**

Bohemia occ., Teplá-Šafářské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 20.III.2024, 1 ex., náplav, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Mogulones euphorbiae* (C. Brisout de Barneville, 1866) NT**

Bohemia occ., Protivec, 1 km s. (5845), vrch Na



Obr./Fig. 5. *Grypus brunnirostris*. Bohemia: Teplá-Kláster.  
Foto/Photo: S. Benedikt.

Karlově, 50°06'39"N 13°12'26"E, 580 m n. m., 23.V.2024, 1 ex., smyk xerothermní louky, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Neophytobius quadrinodosus* (Gyllenhal, 1813)**

Bohemia occ., Chotiměř env. (6444), okolí potoka Zubřina, 49°30'30"N 13°01'41"E, 370 m n. m., 21.V.2024, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

***Otiorhynchus porcatus* (Herbst, 1795)**

Bohemia occ., Úterý intr. (6044), 49°56'32"N 13°00'10"E, 500 m n. m., 14.IV.2024, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Pelenomus canaliculatus* (Fåhraeus, 1843)**

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.V.2024, 1 ex., mokřad, S. Benedikt lgt. et det., nedokladováno; dtto, 20.III.2024, 2 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.; Dobrá Voda, 2 km jz. (6043), rybník U Křížku, 49°58'40"N 12°56'36"E, 660 m n. m., 13.IV.2024, 1 ex., smyk pobřežního mokřadu, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Phytobius leucogaster* (Marsham, 1802)**

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.V.2024, 1 ex., mokřad, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Rhinoncus albicinctus* Gyllenhal, 1837**

Bohemia occ., Teplá, 1,5 km v. (6043), rybník Dolní Koupaliště, 49°58'59"N 12°53'22"E, 680 m n. m., 31.VII.2024, 1 ex., individuální sběr na rdesnu obojživelném (*Persicaria amphibia*), S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Sibinia pyrrhodactyla* (Marsham, 1802)**

Bohemia occ., Albeřice, jv. (5844), vrch Albeřická hůrka, 50°09'41"N 13°10'37"E, 630 m n. m., 20.V.2024, 1 ex.; Čichalov env. (5845), 50°07'38"N 13°10'17"E, 600 m n. m., 23.V.2024, 1 ex.; vždy ve smyku suché louky, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777)**

Bohemia occ., Vysoká Libyně (5946), 50°02'22"N 13°27'17"E, 500 m n. m., 2.VI.2024, 3 ex., M. Ouda lgt. et coll., S. Benedikt det.

Teplomilný polyfágní druh nižších poloh, kde se vyskytuje na suchých loukách a okrajích polí. Pro území západních Čech se jedná o první zaznamenaný nález.

***Trypodendron laeve* Eggers, 1939**

Bohemia occ., Halže (6141), 49°50'44"N 12°30'41"E,

13.V.2024, 2 ex., lapač s návnadou Curviwit, M. Vokoun lgt., K. Resnerová det., doklad nedochován; dtto, 20.V.2024, 2 ex., lapač s návnadou Curviwit, M. Vokoun lgt., K. Resnerová det., doklad nedochován.

Vzácně se vyskytující severský ambrosiový kůrovec. V Česku poprvé zjištěn v roce 2000 na Šumavě na Černé hoře (ZELENÝ 2001). Výskyt tohoto kůrovce není dostatečně zmapován, je znám pouze z několika lokalit v jižních a středních Čechách (LUKÁŠOVÁ et al. 2012, LUKÁŠOVÁ & HOLUŠA 2014, WEGENSTEINER et al. 2016) a z Děčínska (T. Fiala & E. Kula, nepublikovaná data). Na Moravě byl zjištěn pouze v Beskydech a Jeseníkách (PROCHÁZKA et al. 2014, KAŠÁK 2023, KAŠÁK et al. 2024).

*Xylosandrus germanus* (Blandford, 1894)

Bohemia occ., Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 500 m n. m., 22.VI.2024, 1 ex., na dubovém palivovém dřevu, V. Týr lgt. et coll., T. Fiala det.

Další nález tohoto invazivního druhu ze západních Čech, viz také FIALA et al. (2020) a BENEDIKT et al. (2024).

## ELATERIDAE

*Ampedus melanurus* Mulsant & Guillebeau, 1855 CR (Obr. 6)

Bohemia occ., Dolní Hradiště (6046), polesí Jedlina, 49°54'27"N 13°29'42"E, 1.IV.2024, 1 ex., oklep jedle bělokoré (*Abies alba*); Podmokly (6048), PR Lípa, 49°56'19"N 13°44'26"E, 31.X.2024, 1 ex., v kmenu padlé jedle bělokoré (*Abies alba*); oba ex. V. Dongres lgt., det. et coll.

V Česku velmi vzácný xylofágní druh s vývojem v jehličnatých stromech. V Čechách je početnějšími nálezy doložený pouze ze středočeské části Křivoklátska (JANUŠ 2016), na kterou navazují i obě uvedené západočeské lokality. První údaje pro území západních Čech.

*Hypoganus inunctus* (Panzer, 1795) NT

Bohemia occ., Pec pod Čerchovem, 2 km jz. (6642), 49°22'02"N 12°48'35"E, 12.X.2024, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

V Česku poměrně vzácný xylofágní kovařík s vazbou na zachovalé listnaté lesy. Ze západních Čech byl v posledních letech publikován několikrát (BENEDIKT 2010, MERTLIK 2016, BENEDIKT & SIEBER 2018).

*Stenagostus rufus* (DeGeer, 1774) NT

Bohemia occ., Klatovy (6645), lesopark Klatovská Hůrka, 49°23'42"N 13°16'01"E, 15.VII.2024, 1 ex., na světlo při jz. okraji lesa, A. Sieber lgt., det. et coll.

## EUCNEMIDAE


*Melasis buprestoides* (Linnaeus, 1761)

Bohemia occ., Úterý intr. (6044), 49°56'32"N 13°00'10"E, 500 m n. m., 20.VII.2024, 1 ex., na zdi domu, S. Benedikt lgt., det. et coll.

## HELOPHORIDAE

*Helophorus asperatus* Rey, 1885 NT (Obr. 7)

Bohemia occ., Liboc, 1 km j. (5841), niva Ohře, 50°07'10"N 12°30'51"E, 410 m n. m., 12.IV.2024, 2 ex.; Teplá, 1 km sv. (6043), údolí Beranovského potoka, 49°59'43"N 12°52'34"E, 670 m n. m., 22.03.2024, 4 ex.; Teplá-Kláster, 1,5 km jz. (6043), niva Teplé pod Betlémským rybníkem, 49°57'20"N



Obr./Fig. 6. *Ampedus melanurus*. Bohemia: Dolní Hradiště. Foto/Photo: V. Dongres.



12°51'19"E, 670 m n. m., 7.IV.2024, 4 ex.; Úterý, 1 km s. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'54"N 13°00'06"E, 500 m n. m., 14.IV.2024, 2 ex.; vše lov vodním sítkem, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku znám pouze z několika lokalit (BOUKAL et al. 2007). Uvedené nálezy vesměs pocházejí z časně jarních tůní na loukách a představují první nálezy druhu na území západních Čech.

***Helophorus grandis* Illiger, 1798**

Bohemia occ., Liboc, 1 km j. (5841), niva Ohře, 50°07'10"N 12°30'51"E, 410 m n. m., 12.IV.2024, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.; Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 500 m n. m., 21.VI.2024, 2 ex., v zahradní nádrži, V. Týr lgt. et coll., S. Benedikt det.; Teplá, 1,5 km s. (6043), Horní Pstruhový rybník, 49°59'56"N 12°51'53"E, 670 m n. m., 15.III.2024, 1 ex.; Teplá-Kláster, 1,5 km jz. (6043), niva Teplé pod Betlémským rybníkem, 49°57'20"N 12°51'19"E, 670 m n. m., 7.IV.2024, 5 ex.; Teplá-Šafářské Domky, 0,7 km v. (6043), rybník Selský nepřítel, 49°58'33"N 12°54'33"E, 690 m n. m., 22.III.2024, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku rozšířený lokálně na celém území (BOUKAL et al. 2007). Ze západních Čech byl zřejmě poprvé publikován právě z území Tepelské plošiny (BENEDIKT et al. 2024), odkud pochází i většina výše uve-

dených nových nálezů. Vyskytuje se zde nevzácně v jarních tůních na loukách, v pozdějších měsících se druh najít nepodařilo.

**HYDRAENIDAE**

***Hydraena minutissima* Stephens, 1829 NT**

Bohemia occ., Hrozňatov, 1,5 km s. (5940), řeka Odava, 50°02'16"N 12°23'59"E, 440 m n. m., 25.VII.2024, 2 ex.; Tisová, 2 km z. (5942), řeka Teplá, 50°02'39"N 12°49'27"E, 570 m n. m., 6.VII.2024, 1 ex.; Tisová 1,5 km sz. (5943), Otročínský potok, 50°03'12"N 12°50'12"E, 6.VII.2024, 540 m n. m., 3 ex.; Potín, 0,5 km jv. (6144), Úterský potok, 49°53'31"N 13°01'01"E, 420 m n. m., 21.VII.2024, 1 ex.; všechny exempláře nalezeny vymýváním z přeplavovaných mechů na kamenech, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Limnebius aluta* Bedel, 1881**

Bohemia occ., Dobrá Voda, 2 km jz. (6043), rybník U Křížku, 49°58'40"N 12°56'36"E, 660 m n. m., 8.VI.2024, 1 ex., lov vodním sítkem, S. Benedikt lgt., det. et coll.

BOUKAL et al. (2007) hodnotí jeho výskyt v Česku jako velmi lokální. Pro území západních Čech jej uvedli již OUDA (2015) a BENEDIKT et al. (2022b).

***Limnebius atomus* (Duftschmid, 1805)**

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.V.2024, 2 ex.; Bražec, 0,5 km jz. (5844), Bražecké hliňáky, 50°10'19.618"N 13°2'13.335"E, 700 m n. m., 20.VIII.2024, 2 ex.; všechny exempláře odchyceny vodním sítkem v mělčích tůních, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku široce rozšířený druh nížin a pahorkatin (BOUKAL et al. 2007). Pro území západních Čech jde pravděpodobně o první údaje.

***Ochthebius melanescens* Dalla Torre, 1877 EN**

Bohemia occ., Protivec, 1 km jz. (5845), potok Velká Trasovka, 50°05'37"N 13°11'36"E, 470 m n. m., 29.VI.2024, 2 ex.; Hrozňatov, 1,5 km s. (5940), řeka Odava, 50°02'16"N 12°23'59"E, 440 m n. m., 25.VII.2024, 4 ex.; Tisová, 2 km z. (5942), řeka Teplá, 50°02'39"N 12°49'27"E, 570 m n. m., 6.VII.2024, 4 ex.; Tisová 1,5 km sz. (5943), Otročínský potok, 50°03'12"N 12°50'12"E, 6.VII.2024, 540 m n. m., 4 ex.; všechny exempláře nalezeny vymýváním z přeplavovaných mechů na kamenech, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Čechách byl recentní výskyt druhu potvrzen teprve nedávno právě ze západních Čech (BENEDIKT et al. 2011).



Obr./Fig. 7. *Helophorus asperatus*. Bohemia: Teplá-Kláster. Foto/Photo: S. Benedikt.

***Ochthebius metallescens*** Rosenhauer, 1847 EN (Obr. 8)

Bohemia occ., Protivec, 1 km jz. (5845), potok Velká Trasovka, 50°05'37"N 13°11'36"E, 470 m n. m., 29.VI.2024, 1 ex.; Tisová, 2 km z. (5942), řeka Teplá, 50°02'39"N 12°49'27"E, 570 m n. m., 6.VII.2024, 4 ex.; Tisová 1,5 km sz. (5943), Otročinský potok, 50°03'12"N 12°50'12"E, 6.VII.2024, 540 m n. m., 4 ex.; všechny exempláře nalezeny vymýváním z přeplavovaných mečů na kamenech, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku velmi vzácný druh (BOUKAL et al. 2012). Ze západních Čech byl poprvé uvedený z Pramenského potoka ve Slavkovském lese (BENEDIKT et al. 2011).

***Ochthebius pusillus*** Stephens, 1835


Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.V.2024, 4 ex., lov vodním sítkem v mělké tůň, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku lokálně hojný druh (BOUKAL et al. 2007). Pro území západních Čech se pravděpodobně jedná o první publikovaný údaj.

## HYDROCHIDAE

***Hydrochus ignicollis*** Motschulsky, 1860 NT

Bohemia occ., Toužim, 2 km z. (5943), Suchý rybník, 50°03'11"N 12°57'40"E, 630 m n. m., 18.VI.2024, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.



Obr./Fig. 8. *Ochthebius metallescens*. Bohemia: Tisová. Foto/Photo: S. Benedikt.

Výskyt druhu v Česku je uváděn jako lokální (BOUKAL et al. 2007). Z území západních Čech druh uvedli BENEDIKT et al. (2022b, 2023, 2024).

## HYDROPHILIDAE

***Helochaeres lividus*** (Forster, 1771) VU

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.V.2024, 1 ex.; Teplá-Kláster, 1,5 km jz. (6043), niva Teplé pod Betlémským rybníkem, 49°57'20"N 12°51'19"E, 670 m n. m., 7.IV.2024, 1 ex.; oba ex. S. Benedikt lgt., det. et coll.

Podle BOUKALA et al. (2007) je tento vodomil znám recentně pouze z několika málo lokalit v teplejších oblastech Čech a Moravy. Ze západních Čech druh publikovali již BENEDIKT et al. (2024).

***Hydrophilus piceus*** (Linnaeus, 1758) VU

Bohemia occ., Nekmír (6145), PR Bažantnice, spodní rybník, 49°51'50"N 13°15'20"E, 23.VIII.2024, 2 ex., síť na sběr vodního hmyzu, A. Šístková lgt. et det., coll. ZČM; Litohlavy (6247), Horní Kokotský rybník, 49°79'39"N 13°32'40"E, 12.IX.2024, 1 ex., živolovné pasti na principu vrše vnažené kuřecími játry, A. Šístková lgt., det. et coll.

Druh se šíří v rámci celého Česka a v posledních dvou desetiletích i do vyšších poloh (KOLÁŘ 2024).

## KATERETIDAE

***Kateretes pusillus*** (Thunberg, 1794)

Bohemia occ., Branišov, 1 km sv. (6044), Blažejský rybník, 49°59'54"N 13°00'55"E, 600 m n. m., 16.V.2024, 1 ex., S. Benedikt lgt., J. Jelínek det., coll. V. Benedikt.

***Kateretes rufilabris*** (Latreille, 1807) (Obr. 9)

Bohemia occ., Dobrá Voda, 2 km jz. (6043), rybník U Křížku, 49°58'40"N 12°56'36"E, 660 m n. m., 8.VI.2024, 2 ex., S. Benedikt lgt., J. Jelínek det., coll. V. Benedikt.

V Česku vzácnější druh vlhkých luk, který bývá obvykle nacházen ve smyku sítin (*Juncus* spp.) nebo ostríc (*Carex* spp.). Ze západních Čech se zřejmě jedná o první publikovaný nález.

## LIMNICHIDAE

***Limnichus sericeus*** (Duftschmid, 1825) EN

Bohemia occ., Vysoké Jamné, 2,5 km jz. (6142), Kosí potok, 49°52'07"N 12°48'45"E, 470 m n. m., 25.VI.2024, mnoho ex., vymývání kolmých hlinitých břehů, S. Benedikt lgt., det. et coll. (1 ex.).

Obyvatel hlinitých nebo hlinitopísčitých břehů tekou-

cích i stojatých vod, v Česku vzácný druh, známý jen z několika lokalit (BOUKAL et al. 2007, 2012). Ze západních Čech jej publikovali již BENEDIKT et al. (2024) a TÝR (2024).

## MELOIDAE

*Meloe proscarabaeus* Linnaeus, 1758  
Bohemia occ., Pec intr. (6543), 49°23'52"N 12°49'55"E, 6.III.2024, 1 mrtvý ex., M. Schrödel lgt., P. Sladký det., nedokladováno.

## MORDELLIDAE

*Mordellistena kraatzii* Emery, 1876  
Bohemia occ., Albeřice, jv. (5844), vrch Albeřická hůrka, 50°09'41"N 13°10'37"E, 630 m n. m., 20.V.2024, 1 ex.; Protivec, 1 km s. (5845), vrch Na Karlově, 50°06'39"N 13°12'26"E, 580 m n. m., 23.V.2024, 1 ex.; oba ex. smykem xerothermní louky, S. Benedikt lgt. et coll., D. Selnekovič det.  
V Česku vzácný a málo známý xerothermní druh, jen zřídka publikovaný (např. AMBROŽOVÁ 2017). Zřejmě první publikované údaje ze západních Čech.

## MYCETOPHAGIDAE

*Mycetophagus fulvicollis* Fabricius, 1793 VU  
Bohemia occ., Chrastavice, 1 km v. (6542), 49°27'35"N 12°57'56"E, 3.VII.2024, 1 ex., v tlejí-



Obr./Fig. 9. *Kateretes rufilabris*. Bohemia: Dobrá Voda.  
Foto/Photo: S. Benedikt.

cích kmenech jív (*Salix caprea*), J. Lahoda lgt., det. et coll.

## PHLOEOSTICHIDAE

*Phloeostichus denticollis* W. Redtenbacher, 1842 EN  
Bohemia occ., Pec pod Čerchovem, 2 km jz. (6642), 49°22'02"N 12°48'35"E, 12.X.2024, 1 ex., pod kůrou javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*), J. Lahoda lgt., det. et coll.

Eurosibiřský kortikolní druh středních a vyšších poloh, žijící pod šupinami kůry javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*). Výskyt druhu v Česku, kde je známý z většiny horských celků, shrnul MERTLIK (2022, 2023).

## PSEPHENIDAE

*Eubria palustris* (Germar, 1818) VU  
Bohemia occ., Dobrá Voda, 2 km jz. (6043), rybník U Křížku, 49°58'40"N 12°56'36"E, 660 m n. m., 8.VI.2024, 1 ex.; Dobrá Voda, 1 km z. (6043), mokřad u Dřevohryzské kyselky, 49°59'14"N 12°56'59"E, 620 m n. m., 10.VI.2024, 2 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

Druh pramenišť a rašelinišť ve středních až horských polohách, imaga aktivují na vegetaci. Ze západních Čech jej publikovali např. KEJVAL et al. (2006) a BENEDIKT et al. (2021).

## PTINIDAE

*Ochina latreillei* (Bonelli, 1809) EN  
Bohemia occ., Malechov (6545), vrch Běleč, 49°28'40"N 13°14'24"E, 9.VII.2024, 1 ex., oklep jilmu (*Ulmus* sp.), A. Sieber lgt., det. et coll.  
V Česku vzácný červotoč s vazbou na listnaté stromy, především duby (*Quercus* spp.), jilmy (*Ulmus* spp.) a lípy (*Tilia* spp.). V Čechách je tento druh známý z Krivoklátska (JANUŠ 2016), okolí Žihle (TÝR & ZAHRADNÍK 2017) a Branžovského hvozdu (vrchy Doubrava a Řičej; BENEDIKT & SIEBER 2018, BENEDIKT et al. 2024), kam patří i uvedená nová lokalita.

## PYTHIDAE

*Pytho depressus* (Linnaeus, 1767)  
Bohemia occ., Lešišov (6746), 49°15'48"N 13°28'26"E, 1.V.2024, 1 ex., v letu v borovém lese, A. Sieber lgt., det. et coll.

## SALPINGIDAE

*Rabocerus foveolatus* (Ljungh, 1823) VU  
Bohemia occ., Kalec, 1,5 km jz. (5945), údolí Střely,



50°00'50"N 13°18'38"E, 7.IV.2023, 2 ex., oklep větvi jedle bělokoré (*Abies alba*), V. Dongres lgt., det. et coll.

## SCARABAEIDAE

*Agrilinus convexus* (Erichson, 1848)

Bohemia occ., Teplá-Kláster, 1,5 km jz. (6043), 49°57'30"N 12°51'30"E, 28.IV.2024, 2 ex., v exkrementu jelena (*Cervus* sp.) na vlhké louce, V. Dongres lgt. et coll., V. Týr det.

*Limarus zenkeri* (Germar, 1813)

Bohemia occ., Krsy (6044), niva Dolského potoka, 49°55'05"N 13°01'55"E, 1.IX.2022, 4 ex., v exkrementu jelena (*Cervus* sp.), V. Dongres lgt., det. et coll.

*Liothorax niger* Illiger, 1798 NT

Bohemia occ., Teplá-Šafářské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 20.III.2024, 2 ex., náplav, S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.

V Česku vzácnější fytozaprofágní hnojík s výskytem v bahnitých biotopech. Jeho výskyt v západních Čechách shrnul TÝR (2021).

*Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1758) NT

Bohemia occ., Tři Sekery intr. (6041), zahrada domu č. p. 21, 665 m n. m., 49°56'29"N 12°37'12"E, 12.VII.2024, 1 ex., na květech, L. Dvořák observ.

## SCIRTIDAE

*Elodes elongata* Tournier, 1868 DD

Bohemia occ., Prachomety, 1,5 km sv. (5943), mokřad Na rašelině, 50°01'17"N 12°57'43"E, 650 m n. m., 18.VI.2024, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. Druh s preferencí rašelinných lokalit, jehož larvy žijí ve vodě, zatímco imaga aktivují na mokřadní vegetaci. Dlouho nedostatečně potvrzený výskyt v Česku (BOUKAL et al. 2007) definitivně doložil několika nálezy teprve OUDA (2019).

*Hydrocyphon deflexicollis* (P. W. J. Müller, 1821) EN

Bohemia occ., Hrozňatov, 1,5 km s. (5940), řeka Odava, 50°02'16"N 12°23'59"E, 440 m n. m., 25.VII.2024, 1 ex.; Tisová, 2 km z. (5942), řeka Teplá, 50°02'39"N 12°49'27"E, 570 m n. m., 6.VII.2024, 2 ex.; Potín, 0,5 km jv. (6144), Úterský potok, 49°53'31"N 13°01'01"E, 420 m n. m., 21.VII.2024, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku dle BOUKALA et al. (2007, 2012) vzácný hydrofilní druh, jehož vzácnost je ale dána pouze

skrytým způsobem života imág, přičemž přítomnost na lokalitě lze odhalit např. vymýváním přeplovovaných mechů na kamenech v tocích různé vydatnosti od drobných lesních potůčků po čistější říčky (S. Benedikt, nepublikované údaje). Některé nálezy ze západních Čech publikovali např. BENEDIKT et al. (2021).

*Prionocyphon serricornis* (Müller, 1821) VU

Bohemia occ., Klatovy (6645), lesopark Klatovská Hůrka, 49°23'42"N 13°16'01"E, 15.VII.2024, 1 ex., na světlo při jz. okraji lesa, A. Sieber lgt., det. et coll.

## SCRAPTIIDAE

*Anaspis maculata* (Geoffroy, 1785) VU

Bohemia occ., Klatovy (6645), lesopark Klatovská Hůrka, 49°23'43"N 13°15'55"E, 9.V.2024, 3 ex., oklep křovin; Dobřany (6345), PP Šlovický vrch, 49°39'40"N 13°18'51"E, 25.V.2024, 3 ex., smyk travin; vše A. Sieber lgt., det. et coll.

Výskyt druhu v Česku ohlásil z okolí Domažlic KEJVAL (2014) a později ze západních Čech další nález z Horšovského Týna publikovali BENEDIKT et al. (2022b). Aktuální výskyt v Česku je potvrzený z většího území západních a severozápadních Čech a nelze tak vyloučit jeho recentní plošnou expanzi, protože je nepravděpodobné, že by unikal pozornosti několika generací entomologů.

## STAPHYLINIDAE

*Anthobium unicolor* (Marshall, 1802)

Bohemia occ., Úterý, 1 km s. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'54"N 13°00'06"E, 500 m n. m., 14.IV.2024, 1 ex., smyk podrostu olšiny, S. Benedikt lgt., det. et coll.

V Česku vzácný druh výskytem omezený pravděpodobně pouze na západní oblasti Čech, odkud jej v poslední době publikovali např. KRÁSENSKÝ (2017), BLAŽEJ et al. (2020) a BENEDIKT et al. (2022b, 2023, 2024).

*Bisnius sordidus* (Gravenhorst, 1802)

Bohemia occ., Závišín, 1 km sv. (6042), Velký Kolový rybník, 49°59'13"N 12°45'46"E, 720 m n. m., 11.III.2024, 1 ex., prosev, S. Benedikt lgt., det. et coll.

*Bledius pallipes* (Gravenhorst, 1806) EN

Bohemia occ., Vysoké Jamné, 2,5 km jz. (6142), Kosí potok, 49°52'07"N 12°48'45"E, 470 m n. m., 25.VI.2024, mnoho ex., vymýváním hlinitého břehu, S. Benedikt lgt., det. et coll. (1 ex.).

Palearktický ripikolní druh obývající hlinité a hlini-

topísčité břehy čistých vodních toků a jako takový významný indikátor kvalitního přírodního prostředí (BOHÁČ et al. 2007). V Česku jen vzácně doložený druh, početný výskyt je znám z břehů Ohře v Chebské pánvi (S. Benedikt, nepublikované údaje), přesto se pravděpodobně jedná o první publikovaný údaj ze západních Čech.

***Bledius subterraneus* Erichson, 1839 VU**

Bohemia occ., Protivec, 1 km jz. (5845), potok Velká Trasovka, 50°05'37"N 13°11'36"E, 470 m n. m., 29.VI.2024, 2 ex.; Okrouhlá env. (5940), vodní nádrž Jesenice, 50°03'59"N 12°28'04"E, 440 m n. m., 12.IV.2024, 2 ex.; Kojšovice, 2 km sv. (5944), řeka Střela, 30.VIII.2024, 2 ex.; Potín, 0,5 km jv. (6144), Úterský potok, 49°53'31"N 13°01'01"E, 420 m n. m., 21.VII.2024, 1 ex.; vždy vymýváním z písčitých nebo hlinitopísčitých břehů, S. Benedikt lgt. et det., nedokladováno.



Obr./Fig. 10. *Calodera uliginosa*. Bohemia: Křepkovice. Foto/Photo: S. Benedikt.

***Calodera uliginosa* Erichson, 1837 EN (Obr. 10)**

Bohemia occ., Křepkovice, 1 km s. (6043), Starý rybník, 49°57'08"N 12°53'14"E, 670 m n. m., 25.II.2024, 1 ex., prosev pod břehovými porosty; Teplá-Šafářské Domky, 1 km s. (6043), rybník Pirka, 49°58'57"N 12°54'10"E, 690 m n. m., 20.III.2024, 1 ex., náplav; vše S. Benedikt lgt., det. et coll., P. Krásenský revid. Eurosibiřský druh zachovalých mokřadních lokalit, který je v Česku jen vzácně doložen, některé starší doklady publikoval např. ASSING (2003). Zřejmě první publikované nálezy ze západních Čech.

***Gymnusa brevicollis* (Paykull, 1800) EN**

Bohemia occ., Albeřice, 1 km jv. (5844), 50°09'41"N 13°10'37"E, 600 m n. m., 20.VIII.2024, 1 ex., mokřad, S. Benedikt lgt., det. et coll. V západních Čechách vcelku nevzácný druh zachovalých mokřadů, především rašelinných (např. BENE-DIKT 2011, BENE-DIKT et al. 2021, 2022b, 2024).

***Olophrum fuscum* (Gravenhorst, 1806)**

Bohemia occ., Dobrá Voda, 1 km z. (6043), okolí Dřevohryzské kyselky, 49°59'14"N 12°56'59"E, 620 m n. m., 10.VI.2024, 1 ex., vyšlapávání v mokřadu, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Platydacus fulvipes* (Scopoli, 1763) NT**

Bohemia occ., Dobřany (6245), lesopark Martinská stěna, 49°39'54"N 13°17'20"E, 2.V.2022, 1 ex., individuální sběr; Třemošná intr. (6146), 49°48'49"N 13°23'44"E, trávník na sídlišti, 1.V.2023, 1 ex., individuální sběr; oba ex. V. Dongres lgt., det. et coll.

***Platydacus latebricola* (Gravenhorst, 1806) VU**

Bohemia occ., Starý Plzenec (6346), vrch Radyně, 49°41'15"N 13°28'09"E, 19.V.2018, 1 ex., individuální sběr, V. Dongres lgt., det. et coll.

***Quedius infuscatus* Erichson, 1840 CR (Obr. 11)**

Bohemia occ., Sekerské Chalupy env. (6041), údolí Kosiho potoka, 5.VIII.2024, 1 ex., prosev dutiny javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*), M. Kuboň lgt., det. et coll.

V Česku velmi vzácný druh žijící v dutinách starých listnatých stromů, který byl dosud doložen pravděpodobně pouze z Křivoklátska (SMETANA 1958, JANUŠ 2016). První nález na území západních Čech.

***Syntomium aeneum* (P. W. J. Müller, 1821) NT**

Bohemia occ., Žihle (5946), zahrada u domu č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 500 m n. m., 29.VI.2024, 1 ex., V. Týr lgt. et coll., S. Benedikt det.; Úterý, 1 km s. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'54"N 13°00'06"E, 500 m n. m., 14.IV.2024, 1 ex., smyk podrostu olšiny, S. Benedikt lgt., det. et coll.

## TENEBRIONIDAE

### *Corticeus fraxini* (Kugelann, 1794) EN

Bohemia occ., Letiny, 1 km s. (6446), 49°33'12"N 13°26'29"E, smíšený les, pod kůrou poraženého smrku ztepilého (*Picea abies*), 23.III.2024, 3 ex.; dtto, 1.V.2024, 5 ex.; V. Benedikt lgt., det. et coll.

Další nálezy tohoto aktuálně expandujícího predátora kůrovců, jehož první nález v západních Čechách ohlásili NOVÁK et al. (2020) a později také BENEDIKT et al. (2021, 2023).

### *Corticeus linearis* (Fabricius, 1790) VU

Bohemia occ., Chrastavice, 1 km s. (6542), 49°28'12"N 12°57'00"E, I.2024, 3 ex., odchov z větvi jedle bělokoré (*Abies alba*), J. Lahoda lgt., det. et coll.



Obr./Fig. 11. *Quedius infuscatus*. Bohemia: Sekerské Chalupy. Foto/Photo: P. Boža & A. Sedláček.

## TROGOSITIDAE

### *Grynocharis oblonga* (Linnaeus, 1758) VU

Bohemia occ., Dolní Hradiště (6046), polesí Jedlina, 49°54'27"N 13°29'42"E, 1.IV.2024, 1 ex., pod kůrou suché jedle bělokoré (*Abies alba*); Kalec, 1,5 km jz. (5945), údolí Střely, 50°00'50"N 13°18'38"E, 7.IV.2023, 3 ex., pod kůrou suché jedle bělokoré (*Abies alba*); vše V. Dongres lgt., det. et coll.

## ZOPHERIDAE

### *Aulonium trisulcum* (Geoffroy, 1785) VU

Bohemia occ., Starý Plzenec (6346), vrch Ostrá hůrka, 49°41'56"N 13°26'18"E, 8.VII.2024, 1 ex., světlá past, V. Benedikt jr. lgt., V. Benedikt det. et coll. V Česku poměrně vzácný druh žijící na listnácích v chodbách kůrovců (*Scolytus* spp.). Ze západních Čech byl v poslední době publikován několikrát (BENEDIKT et al. 2022b, 2023, 2024).

### *Synchita undata* (Guérin-Méneville, 1844) EN

Bohemia occ., Pec pod Čerchovem, 2 km jz. (6642), 49°22'02"N 12°48'35"E, 12.X.2024, sběr pod kůrou javoru kleny (*Acer pseudoplatanus*), 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

Vzácnější druh zachovalých listnatých lesů, kde žije na odumírajícím dřevě napadeném houbami. Ze západních Čech jej v poslední době publikovali TÝR (2012) a BENEDIKT et al. (2022b, 2023).

### *Synchita variegata* Hellwig, 1792 EN

Bohemia occ., Řakom (6545), vrch Doubrava, 49°26'7"N 13°12'24"E, 26.VI.2024, 2 ex., oklep dubu (*Quercus* sp.) při lesní cestě, A. Sieber lgt., det. et coll.

Hodnocení druhu je obdobné předchozímu, ze západních Čech jej publikovali např. TÝR (2012), BENEDIKT & SIEBER (2018) a BENEDIKT et al. (2022b).

## PODĚKOVÁNÍ

Za poskytnutí údaje ke druhu *Quedius infuscatus* Erichson, 1840 děkujeme Milanu Kuboňovi (Ostrava). Za podnětné připomínky k rukopisu patří poděkování Lukáši Blažejovi (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě) a Jiřímu Stanovskému (Ostrava). Poděkování patří také všem výše uvedeným determinátorům mimo autorský kolektiv.

## LITERATURA

ALONSO-ZARAZAGA M. A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B., LYAL C. H. C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA



- M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A. J. & YUNAKOV N. N. 2023: Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2<sup>nd</sup> Edition. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa* **14**: 1–780.
- AMBROŽOVÁ L. 2017: *Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků. (Effect of grazing by large herbivores on arthropod and beetle communities in a temperate steppe)*. Unpublished manuscript, 45 pp. [Deposited in: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta].
- ASSING V. 2003: A revision of Calodera Mannerheim. II. A new species, new synonyms, and additional records (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Beiträge zur Entomologie* **53**: 217–230.
- BENEDIKT S. 2010: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Kaňon Ohře (Site of Community Importance Natura 2000)). *Západočeské entomologické listy* **1**: 1–15. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S. 2011: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina – Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Bystřina – Lužní Potok (Site of Community Importance Natura 2000)). *Západočeské entomologické listy* **2**: 13–36. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., BENEDIKT V., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., HEJKAL J., KRESL P., LAHODA J., SIEBER A., ŠIMEČEK J. & TÝR V. 2023: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 3. Coleoptera (2018–2022). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 3. Coleoptera (2018–2022)). *Západočeské entomologické listy* **14**: 43–59. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., BENEDIKT V., DVOŘÁK L., FIALA T., HEJKAL J., LAHODA J., OUDA M., PÁVEK J., SIEBER A., SLADKÝ P. & TÝR V. 2024: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 4. Coleoptera (2018–2023). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 4. Coleoptera (2018–2023)). *Západočeské entomologické listy* **15**: 93–107. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. *Klapalekiana* **46** (Supplementum): 1–363.
- BENEDIKT S., BOROVEC R., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & STEJSKAL R. 2022a: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 2. díl. (Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea except for Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 2.). *Klapalekiana* **58**: 205–567.
- BENEDIKT S., BOUKAL M. & STRAKA M. 2011: Ochthebius melanescens – potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydraenidae). (Ochthebius melanescens – occurrence confirmed in Bohemia (Coleoptera: Hydraenidae)). *Západočeské entomologické listy* **2**: 41–43. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., LAHODA J., OUDA M., SIEBER A. & TÝR V. 2022b: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 2. Coleoptera (2018–2021). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 2. Coleoptera (2018–2021)). *Západočeské entomologické listy* **13**: 86–104. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., OUDA M., SIEBER A. & TÝR V. 2021: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 1. Coleoptera (2018–2020). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 1. Coleoptera (2018–2020)). *Západočeské entomologické listy* **12**: 84–99. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S. & SIEBER A. 2018: Fauna brouků (Coleoptera) vrchu Říče s přírodní rezervací Bělýšov. (Beetle fauna of the Říče hill with the Bělýšov Nature Reserve). *Západočeské entomologické listy* **9**: 7–33. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BIOLIB 1999–2024: Nástroj pro výpočet mapových čtverců metodou KFME. [A tool for the assessment of map squares using the KFME method]. Online: <https://www.biolib.cz/cz/toolKFME/>.
- BLAŽEJ L., KRÁSENSKÝ P. & ŠVARC M. 2020: Střevlíkovití a drabčíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) Novodvorského rybníka V. (Obec Ralsko, severní Čechy). (Ground beetles and rove beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) of Novodvorský V. pond (Ralsko env., northern Bohemia, Czech Republic)). *Bezďez* **29**: 75–104.
- BOHÁČ J., MATĚJČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. *Časopis Slezského Muzea Opava (A)* **56**: 227–276.
- BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠTASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriidae, Gyrinidae, Halplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). *Klapalekiana* **43** (Supplementum): 1–289.
- BOUKAL D. S., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KONVIČKA O., KŘIVAN V., SEJKORA R., SKALICKÝ S., STRAKA M., SYCHRA J. & TRÁVNÍČEK D. 2012: Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). (New and interesting records of water beetles from the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae)). *Klapalekiana* **48**: 1–21.
- BUCHTOVÁ L. 2025: *Soupis sbírky brouků deponované v Západočeském muzeu v Plzni. (A list of coleopteran*

- collection deposite at West Bohemian Museum). Unpublished manuscript, 143 pp. [Deposited in: Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta].
- DANILEVSKI M. 2020: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6/1. Chrysomeloidea I (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and Revised Second Edition*. Brill, Leiden & Boston, 712 pp.
- FIALA T. 2021: Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v přírodní rezervaci Vladař. (The bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in the Vladař Nature Reserve). *Západočeské entomologické listy* **12**: 59–64. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- FIALA T., HOLUŠA J., PROCHÁZKA J., ČÍZEK L., DZURENKO M., FOIT J., GALKO J., KAŠÁK J., KULFAN J., LAKATOS F., NAKLÁDAL O., SCHLAGHAMERSKÝ J., SVATOŠ M., TROMBIK J., ZÁBRANSKÝ P., ZACH P. & KULA E. 2020: *Xylosandrus germanus* in Central Europe: Spread into and within the Czech Republic. *Journal of Applied Entomology* **144**: 423–433.
- FIALA T., KNÍŽEK M. & HOLUŠA J. 2021: Continued eastward spread of the invasive ambrosia beetle *Cyclorhipidion bodoanum* (Reitter, 1913) in Europe and its distribution in the world. *BioInvasions Records* **10/1**: 65–73.
- HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). *Příroda* **36**: 1–612.
- IWAN D. & LÖBL I. 2020 (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Revised and Updated Second Edition*. Brill, Leiden & Boston, 945 pp.
- JANUŠ J. 2016: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. (Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve). *Západočeské entomologické listy Supplementum 1*: 1–449. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- JANUŠ J., MORAVEC P., RÉBL K. & ZÝKA M. 2022: Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko (3) – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2018–2019. (Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve (3) – Results of a faunistic survey and inventory in the years 2018 and 2019). *Ela-teridarium* **16**: 226–322. Online: <https://www.elateridae.com/elateridarium/>.
- KAŠÁK J. 2023: *Inventarizace MZCHÚ – PR Bučina pod Františkovou myslivnou – Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři*. [Inventory of SSPA – Bučina pod Františkovou myslivnou NR – Saproxylic insects and epigeic predators]. Unpublished manuscript, 24 pp. [Deposited in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha].
- KAŠÁK J., KOČVARA R., MIŘIJOVSKÝ J. & MARTINEK P. 2024: *Výhodnocení stavu přirozených lesních porostů v EVL Rejvíz v průběhu kůrovcového rozpadu, srovnání s EVL Praděd (NPR Rašeliniště Skřítek)*. [Evaluation of the state of natural forest stands in Rejvíz SAC during bark beetle decay, comparison with Praděd SAC (Rašeliniště Skřítek NNR)]. Unpublished manuscript, 87 pp. [Deposited in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha].
- KEJVAL Z. 2014: Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce muzea Chodska. (Beetles of the family Scraptiidae in the collection of Museum of Chodsko region). *Západočeské entomologické listy* **5**: 27–31. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- KEJVAL Z. & BENEDIKT S. 2009: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2004–2008. (Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in Western Bohemia in 2004–2008). *Erica* **16**: 73–96.
- KEJVAL Z., BENEDIKT S. & DOLEŽAL Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005–2006. (Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in Western Bohemia in 2005–2006). *Erica* **15**: 57–85.
- KEJVAL Z., BENEDIKT S., DONGRES V. & DOLEŽAL Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožděanská louka). (Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in western Bohemia (Čerchovské hvozdy, Pastviště u Fínů and Soos national nature reserves, Železná hůrka national nature monument, Kamenný rybník, Lopata and Starý Hirštejn nature reserves, Příšovská homolka and Hvožděanská louka nature monuments)). *Erica* **13**: 49–65.
- KOLÁŘ V. 2024: Pomozte mapovat naše velké vodomily. (Help to Map out Our Great Hydrophilidae). *Živa* **2024**: 337–339.
- KRÁSENSKÝ P. 2018: Drabčici (Coleoptera: Staphylinidae) rašelinné louky a nivy potoka u Počátek na Kraslicku (západní Čechy). (Rove Beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of peat bog meadow and floodplain meadow near Počátky in Kraslice region (Western Bohemia)). *Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná* **39 (2017)**: 130–142.
- LOVĚTINSKÝ M., ZÝKA M. & BENEDIKT S. 2021: Faunistické zprávy ze západních Čech – 20. Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae. (Faunistic records from western Bohemia – 20. Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae). *Západočeské entomologické listy* **12**: 48–51. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- LÖBL I. & LÖBL D. (eds) 2015: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2/1. Hydrophiloidea – Staphylinoidea, Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, xxvi + 900 pp.
- LÖBL I. & LÖBL D. (eds) 2016: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, i–xxviii + 983 pp.
- LÖBL I. & LÖBL D. (eds) 2017: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1. Archostemata, Myxophaga, Adephaga. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, i–xxxiv + 1443 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2007: *Catalogue of Pala-*

- earctic Coleoptera 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
- LUKÁŠOVÁ K. & HOLUŠA J. 2014: Comparison of *Trypodendron lineatum*, *T. domesticum* and *T. laeve* (Coleoptera: Curculionidae) flight activity in Central Europe. *Journal of Forest Science* **60**: 382–387.
- LUKÁŠOVÁ K., KNÍŽEK M., HOLUŠA J., ČEJKA M. & KACPRZYK M. 2012: Is the bark beetle *Trypodendron laeve* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) an alien pest in the Czech Republic and Poland? *Polish Journal of Ecology* **60**: 789–795.
- MERTLIK J. 2016: Faunistické mapování kovaříků *Calambus bipustulatus* a *Hypoganus inunctus* (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. (Faunistics of *Calambus bipustulatus* and *Hypoganus inunctus* (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia). *Elateridarium* **10**: 43–84. Online: <http://elateridae.com/elateridarium/>.
- MERTLIK J. 2022: Výsledky faunistického mapování druhu *Phloeostichus denticollis* (Coleoptera, Phloeostichidae) na území východních Čech. (Results of the faunistic research of *Phloeostichus denticollis* (Coleoptera, Phloeostichidae) in eastern Bohemia). *Elateridarium* **16**: 1–9. Online: <http://elateridae.com/elateridarium/>.
- MERTLIK J. 2023: Nové nálezy druhu *Phloeostichus denticollis* (Coleoptera, Phloeostichidae) na území Česka. (New findings of *Phloeostichus denticollis* (Coleoptera, Phloeostichidae) in the Czechia). *Elateridarium* **17**: 35–40. Online: <http://elateridae.com/elateridarium/>.
- NOVÁK V., BRŮHA P., KOUKLÍK O., KRÁSENSKÝ P., MICHALEGA M., MIKÁT M., MORAVEC P., RŮŽIČKA T., ŠÍMA A., TÝR V. & ZÚBER M. 2020: Faunistic records from the Czech Republic – 487. Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae. *Klapalekiana* **56**: 139–140.
- OUDA M. 2019: Fauna brouků (Coleoptera) přírodní památky Kounické louky. (Beetles (Coleoptera) of the Kounické louky Nature Monument). *Západočeské entomologické listy* **10**: 44–57. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- PROCHÁZKA J., SCHLAGHAMERSKÝ J. & KNÍŽEK M. 2014: Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) jedlobukových lesů CHKO Beskydy. (Bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in beech-fir forests of the Beskydy Protected Landscape Area, Czech Republic). *Zprávy lesnického výzkumu* **59**: 126–132.
- SLÁMA M. 1998: *Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky*. [Longhorn beetles (Cerambycidae) of the Czech and Slovak republics]. Milan Sláma. Vlastním nákladem, Krhanice, 383 pp.
- SMETANA A. 1958: *Drabčíkovití – Staphylinidae I – Staphylininae*. Fauna ČSR. Svazek 12. ČSAV, Praha, 435 pp.
- TÝR V. 2011: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 4. část. Cerambycidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 4. Cerambycidae). *Západočeské entomologické listy* **2**: 70–80. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2012: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 5. část. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptidae). (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 5. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptidae)). *Západočeské entomologické listy* **3**: 22–29. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2021: Soupis nálezů vrubounovitých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) ze západních Čech. (Inventory of lamellicorn beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) from western Bohemia). *Západočeské entomologické listy Supplementum 2*: 1–85. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2024: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 16. část. Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Byrrhidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Hydraenidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 16. Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Byrrhidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Hydraenidae). *Západočeské entomologické listy* **15**: 1–12. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. & ZAHRADNÍK P. 2017: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 12. část. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 12. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae). *Západočeské entomologické listy* **8**: 76–85. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- VANĚK O., WALTER J., HRADSKÁ I. & FALTÝNEK FRIC Z. 2023: Bark or crown? Spiders (Araneae) and beetles (Coleoptera) on trees in a city centre. *European Journal of Entomology* **120**: 52–58.
- VESELÝ P., ŠLACHTA M., BLÍZEK J. & HEJKAL J. 2012: Pozoruhodný výskyt střevlíka *Ophonus (Ophonus) ardosiacus* (Lutshnik, 1922) v západních Čechách. (Noteworthy occurrence of ground beetle *Ophonus (Ophonus) ardosiacus* (Lutshnik, 1922) in Western Bohemia). *Eri-ca* **19**: 129–137.
- VONIČKA P., MARHOUL P. & ČÍŽEK O. 2022: Příspěvek k fauně střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) bývalých vojenských prostorů v České republice. (On the fauna of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in former military areas in the Czech Republic). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* **40**: 91–114.
- WALTER J., BEZDĚČKOVÁ K., CIHLÁŘ V., HLADOVÁ M., KLIMEŠ P., KONVIČKA M., PERLÍK M., POTOCKÝ P., TĚTÁL I. & VODIČKA S. 2025: Hmyzí společenstvo přírodní památky Šlovický vrch u Dobřan. (Insect communities of Šlovický vrch Nature Monument near Dobřany). *Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda* **131**: 139–160.
- WALTER J., HRADSKÁ I., VODIČKA S., PODESTÁTOVÁ B. & VAŇKOVÁ N. 2024: Vybrané skupiny bezobratlých přírodních rezervace Diana v Českém lese. (Selected groups of invertebrates of the Diana Nature Reserve in Český



- les Mts). *Erica* **31**: 57–79.
- WEGENSTEINER R., LUKÁŠOVÁ K., VANICKÁ H., ZIMOVÁ S., KACPRZYK M. & HOLUŠA J. 2016: Extremely low infection levels of pathogens and nematodes in *Trypodendron* spp. (Coleoptera: Curculionidae). *Lesnícky časopis – Forestry Journal* **62**: 202–206.
- ZELENÝ J. 2001: Nejčastější kůrovcovití na smrku na Šumavě. [The most common bark beetles on spruce in Šumava]. *Lesnická práce* **80**: 258–259.
- ZRUBCOVÁ Ž. 2024: *Bezobratlí školní zahrady. (Invertebrates of a school garden)*. Unpublished manuscript, 45 pp. [Deposited in: Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta].

*Obdrženo do redakce 23.9.2025*

*Přijato po recenzích: 1.11.2025*