

Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) v Česku

Matúš Kocian¹ & Jiří Ch. Vávra²

¹Družicová 2, CZ-161 00 Praha 6; e-mail: matusko@matuskocian.cz

²Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Chittussiho 10, CZ-710 00 Ostrava; e-mail: vavr.jiri@seznam.cz

KOCIAN M. & VÁVRA J. CH. 2026: Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) v Česku. (New and confirmed species of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Czechia). *Západočeské entomologické listy* 17: 22–31, 14-2-2026.

Abstract. Eleven species from the family Staphylinidae (Coleoptera), subfamily Aleocharinae: *Aleochara grandeguttata* Assing, 2009, *A. signata* (J. Sahlberg, 1876), *Atheta sodermani* Bernhauer, 1931, *A. speluncicollis* Bernhauer, 1909, *Cousya nigrata* (Fairmaire et Laboulbène, 1856), *Cypha aprilis* (Rey, 1882), *Dochmonota rudiventris* (Eppelsheim, 1886), *Euryalea murina* (Erichson, 1839), *Geostiba lucens* (G. Benick, 1970), *Pentanota meuseli* Bernhauer, 1905, and subfamily Oxytelinae: *Bledius occidentalis* Bondroit, 1907, are reported from Czechia for the first time. Two species from the subfamily Oxytelinae, *Bledius heterocerus* Eppelsheim, 1889 and *B. unicornis* (Germar, 1825), are confirmed for the same country after 80 and 90 years respectively. Furthermore, five species of rove beetles of the subfamily Aleocharinae, namely *Atheta glabricula* C. G. Thomson, 1867, *A. ischnocera* C. G. Thomson, 1870, *Cypha seminulum* (Erichson, 1839), *Oxypoda doderoi* Bernhauer, 1902, and *O. nigrocincta* Mulsant et Rey, 1875, are recorded from Moravia for the first time. The distribution of all species is presented and notes on the ecology and collection circumstances for selected taxa are added.

Key words: faunistics, new records, Aleocharinae, Oxytelinae, Bohemia, Moravia

ÚVOD

Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) jsou v Česku druhově nejpočetnější čeledí v rámci celého řádu. Zároveň patří také mezi determinčně nejobtížnější, přičemž spolehlivé určení vyžaduje obvykle spolupráci specialistů na jednotlivé skupiny druhů. Poslední seznam druhů této čeledi pro území Česka publikovali BOHÁČ et al. (2007). Později některé novinky pro domácí faunu přinesli i další autoři, např. ŠTOURAČ (2008, 2012), VÁVRA (2011), VÁVRA et al. (2011), KRÁSENSKÝ (2013), MANTIČ (2022), BENEDIKT & KRÁSENSKÝ (2023). Předkládaný příspěvek uvádí informace o 18 druzích čeledi. Z nich 11 druhů je nových pro území Česka, dva druhy jsou potvrzené pro toto území po 80, resp. 90 letech a pro pět druhů jsou uvedeny první nálezy na území Moravy.

METODIKA

Nomenklatura je uvedena podle aktuálního palearktického katalogu brouků (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Všechny taxony, včetně vyšších systematických jednotek, jsou řazeny abecedně. Lokality jsou řazeny geograficky od jihu k severu, v rámci oblasti

pak podle data sběru od nejstaršího po nejnovější, a jsou doplněny čísly faunistických mapových čtverců podle vypracované metodiky (ZELENÝ 1972). Na konci náleзовého údaje je v závorce uvedena zkratka sbírky, ve které je materiál uložen.

Použité zkratky:

bor. – severní, centr. – střední, coll. – sbírka s uložením dokladů, det. – určil, dtto – tamtéž, env. – okolí, ex. – exemplář/-e, CHKO – chráněná krajinná oblast, leg. – sbíral, mer. – jižní, NP – národní park, NPP – národní přírodní památka, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, revid. – revidoval, sv. – severovýchodně.

Zkratky sbírek:

CJJ – privátní sbírka Jiří Janák (Rtyně nad Bílinou), CJV – privátní sbírka Jiří Vávra (Ostrava), CMK – privátní sbírka Matúš Kocian (Praha), CPK – privátní sbírka Pavel Krásenský (Chomutov), CPM – privátní sbírka Pavel Moravec (Litoměřice), CPV – privátní sbírka Pavel Vonička (Liberec), CSB – privátní sbírka Stanislav Benedikt (Plzeň), CVO – privátní sbírka Jürgen Vogel (Görlitz), MMB – Moravské zemské muzeum (Brno), NMP – Národní muzeum (Praha).

PŘEHLED NÁLEZŮ

STAPHYLINIDAE

Aleocharinae

Aleochara grandeguttata Assing, 2009 (Obr. 1)
Bohemia centr.: Praha-Košíře, „Cibulka“ (5952), 8.XII.1906, 1 ex., V. Kracík [leg.] (NMP: coll. Kracík); Praha-Petřín (5952), 2.IV.1907, 1 ex., [bez jména sběratele] (NMP: coll. Holík); Kralupy [nad Vltavou] (5751), IV.1953, 3 ex., Hájek [leg.] (NMP); dtto, VI.1942, 1 ex., [bez jména sběratele] (NMP). Bohemia bor.: Turnov env., Malá Skála (5357), [bez data sběru], 1 ex., J. Obenberger [leg.] (NMP); CHKO České středohoří, Kozly – vrch Svinky (5548), 28.VIII.1982, 1 ex., P. Moravec leg. (CPM); CHKO České středohoří, Skršín (5548), 22.IV.1984, 1 ♂, P. Moravec leg. (CJJ); CHKO České středohoří, Skalice – vrch Bílá Stráž (5450), 20.X.1984, 1 ex., P. Moravec leg. (CPM); CHKO České středohoří, Chraberce, 300 m sv. od obce, „vrch Týnecký Chlum“ [vrch v současnosti vytěžený a geograficky již ne-

značený] (5549), 50°24'42.932"N 13°50'10.050"E, 19.V.1985, 1 ex., P. Moravec leg. (CPM); CHKO České středohoří, Skalice (5450), 22.IV.–22.V.1998, 1 ex., zemní past, A. Štorkánová et P. Moravec leg. (CPM); CHKO České středohoří, Louny env., NPR Raná (5548), 18.IV.–20.V.2012, 1 ♀, zemní past, A. Kůrka leg. (CPM). Všechny exempláře M. Kocian det.

Druh nedávno popsáný z Turecka a zatím velmi málo známý, blízce příbuzný druhu *Aleochara laevigata* Gyllenhal, 1810 (ASSING 2009). Dosud je hlášený pouze z Maďarska, Rumunska, Arménie, Turecka (SCHÜLKE & SMETANA 2015) a Ukrajiny (ASSING 2018a). Podle dosavadních nálezů se jedná, podobně jako u příbuzných druhů, především o koprofágní druh, nacházený často v trusu pastevních zvířat, např. koní (*Equus* spp.).

Nový druh pro Česko.

Aleochara signata (J. Sahlberg, 1876) (Obr. 2)
Bohemia bor.: CHKO České středohoří, Třebívlice – vrch Libeš (5549), 405 m n. m., 24.III.1977, 1 ex.,



Obr./Fig. 1. *Aleochara grandeguttata*. Foto/Photo: P. Krásenský.



Obr./Fig. 2. *Aleochara signata*. Foto/Photo: P. Krásenský.

P. Moravec leg., M. Kocian det. (CPM); CHKO České středohoří, Měřunice – vrch Vraník (5548), 8.VIII.1982, 1 ♂, P. Moravec leg., M. Kocian det. (CPM); CHKO České středohoří, Louny env., NPR Raná (5548), 5.IV.1993, 1 ♂, 1 ♀, P. Moravec leg. et det. (CPM); CHKO České středohoří, Medvědice env., PR Lipská hora (5449), 14.VII.–5.VIII.1993, 3 ex., zemní past, P. Moravec leg., M. Kocian det. (CJJ: 1 ex., CMK: 2 ex.); dtto, 5.–26.VIII.1993, 1 ♀, zemní past, P. Moravec leg., M. Kocian det. (CPM); CHKO České středohoří, Bělušice env., PR Milá (5548), 15.XII.2014, 1 ♂, P. Moravec leg., M. Kocian det. (CPM); Kostelec nad Ohří env., PR Myslivna (5650), 26.VII.2007, 3 ex., P. Moravec leg., M. Kocian det. (CPM: 1 ex., CMK: 2 ex.).

Druh s nedostatečně známým rozšířením, dosud hlášený z Německa, centrální části Ruska, východní Sibíře a Mongolska (ASSING 2009, SCHÜLKE & SMETANA 2015). Často zaměňován s velmi podobným druhem *A. laevigata* (blíže ASSING 2009).

Nový druh pro Česko.

Atheta glabricula C. G. Thomson, 1867

Moravia mer.: Lanžhot env., NPR Cahnov-Soutok [nyní NPR Lanžhotské pralesy] (7367), 48°39'16"N

16°56'27"E, 152 m n. m., 3.–20.V.2021, 1 ex., letová past, P. Baňar et J. Procházka leg., M. Kocian det. (CMK).

Evropský druh, široce rozšířený především v západní a severní Evropě, také na Balkáně. Je uvedený ze všech středoevropských států (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Z Česka je známo jen velmi málo údajů pouze z Čech, současné nálezy jsou hlášeny z Prahy-Řáblic (ŠTOURAC 2006) a z Rudy v CHKO Křivoklátsko (JANUŠ et al. 2022).

Nový druh pro Moravu.

Atheta ischnocera C. G. Thomson, 1870 (Obr. 3)

Moravia mer.: NP Podyjí, Znojmo env., Mašovice-střelnice (7161), 10.V.2021, 1 ♀, prosev trusu koně (*Equus ferus caballus*) na pastvině, J. Vávra leg. et det. (CJV).

Široce rozšířený druh v celé Evropě, vyskytující se od Španělska na jihu až po Skandinávii a severní část Ruska na severu. Ve střední Evropě je hlášený z Rakouska, České republiky, Německa, Švýcarska (SCHÜLKE & SMETANA 2015) a ze Slovenska (BENEDIKT et al. 2015). Na našem území známý pouze z Čech z velmi mála lokalit, např. z Lán-Lánské obory v CHKO Křivoklátsko (JANUŠ et al. 2022). Eko-



Obr./Fig. 3. *Atheta ischnocera*. Foto/Photo: J. Sitek.



Obr./Fig. 4. *Atheta sodermani*. Foto/Photo: P. Krásenský.

logické nároky jsou málo známe, podle dosavadních údajů lze soudit, že se jedná o saprofágní druh. Nejvíce nálezů pochází z trusu pastevních zvířat.

Nový druh pro Moravu.

Atheta sodermani Bernhauer, 1931 (Obr. 4)

Bohemia centr.: CHKO Brdy, Jince env., PR Koníček (6249), 49°46'25.945"N 13°56'52.433"E, 550 m n. m., 19.V.–4.VI.2020, 1 ex., letová past; dtto, 4.–18.VI.2020, 1 ex., letová past; CHKO Brdy, Jince env., PP Vystrkov (6249), 49°46'41.098"N 13°57'55.834"E, 480 m n. m., 19.V.–4.VI.2020, 2 ex., letová past. Všechny exempláře P. Baňar et M. Kocian leg., M. Kocian det. (CMK).

Evropský druh, rozšířený od Velké Británie po centrální část Ruska. Známý je z Holandska (VORST 2010), Francie, Itálie a celé Skandinávie, ve střední Evropě je hlášený z Rakouska, Německa a Polska (SCHÜLKE & SMETANA 2015, GUTOWSKI et al. 2024).

Nový druh pro Česko.

Atheta speluncicollis Bernhauer, 1909 (Obr. 5)

Bohemia mer.: Týn nad Vltavou (6752), 10.VIII.1912, [bez jména sběratele], 2 ex., M. Kocian det. (NMP). Bohemia centr.: CHKO Brdy, Jince env., PR Koníček (6249), 49°46'25.945"N 13°56'52.433"E, 550 m n. m., 4.–18.VI.2020, 1 ex., letová past, P. Baňar et M. Kocian leg., J. Vogel det. (CVO); CHKO Brdy, Jince env., PP Vystrkov (6249), 49°46'41.098"N 13°57'55.834"E, 480 m n. m., 19.V.–4.VI.2020, 1 ex., letová past, P. Baňar et M. Kocian leg., J. Vogel det. (CMK).

Evropský druh, rozšířený především v Alpách, známý z Rakouska, Francie, Německa, Itálie a Švýcarska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Málo známý, pravděpodobně horský druh, nalézáný především na plodnicích dřevokazných hub (SCHMIDL & BUSSLER 2004).

Nový druh pro Česko.

Cousya nigrata (Fairmaire et Laboulbène, 1856) (Obr. 6)

Bohemia centr.: Velký Osek env., NPR Libický luh (5857), 50°06'06"N 15°10'39"E, 29.IV.2013, 1 ex.,



Obr./Fig. 5. *Atheta speluncicollis*. Foto/Photo: P. Krásenský.



Obr./Fig. 6. *Cousya nigrata*. Foto/Photo: P. Krásenský.

prosev, M. Kocian leg., T. Jászay et M. Kocian det. (CMK).

Holomediterránní druh, východně zasahující do asijské části Turecka a do Libanonu (ASSING 2018b). Ve střední Evropě je hlášený z Rakouska, Německa, Maďarska, Slovenska a Švýcarska (SCHÜLKE & SMETANA 2015).

Nový druh pro Česko.

Cypha aprilis (Rey, 1882) (Obr. 7)

Bohemia mer.: „S. Böhmerwald, Tanzer. / Schneiderschl. [= Schneiderschlag]“ [Šumava, F. Tanzer leg., Krejčovice], IV.1928, 1 ♂, M. Kocian det. (NMP).

Pozn. Lokalita Krejčovice (= Schneiderschlag) byla v době nálezů druhu bydlištěm Filipa Tanzera, odkud podnikal sběratelské výpravy na blízké kopce Boubín a Bobík nedaleko Volar (poznatky autorů).

Druh, rozšířený především v západní a severní Evropě, hlášený také z Maroka. Ve střední Evropě známý pouze z Německa a Rakouska (SCHÜLKE & SMETANA 2015).

Nový druh pro Česko.

Cypha seminulum (Erichson, 1839)

Moravia mer.: Lanžhot env., NPR Cahnov-Soutok [nyní NPR Lanžhotské pralesy] (7367), 48°39'16"N 16°56'27"E, 152 m n. m., 3.–20.V.2021, 1 ex., leto-

vá past; dtto, 20.V.–10.VI.2021, 3 ex., letová past. Všechny exempláře P. Baňar et J. Procházka leg., M. Kocian det. (CMK).

Široce rozšířený druh v celé Evropě, také v severní Africe. Ve střední Evropě hlášený z Rakouska, České republiky, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Z našeho území jsou pouze z Čech známy staré údaje z okolí Veselí nad Lužnicí (ROUBAL 1932) a z Prahy-Šárky (HAVELKA & DVOŘÁK 1952).

Nový druh pro Moravu.

Dochmonota rudiventris (Eppelsheim, 1886) (Obr. 8)

Bohemia centr.: Čelákovice (5854), 15.IV.1917, 1 ex., v náplavu, F. Rambousek leg., M. Kocian det. (NMP). Moravia mer.: CHKO Soutok, Břeclav env., NPP Soutok (7267), 10.V.2008, 1 ♀; dtto, 11.V.2008, 1 ♂; oba exempláře byly nalezeny v bažině nedaleko zámku Pohansko, P. Krásenský leg. et det. (CPK). Eurosibiřský druh, introdukovaný také do Nearktické oblasti (SCHÜLKE & SMETANA 2015, KLIMASZEWSKI et al. 2018). Ve střední Evropě známý z Rakouska, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska (SCHÜLKE & SMETANA 2015).

Nový druh pro Česko.



Obr./Fig. 7. *Cypha aprilis*. Foto/Photo: P. Krásenský.



Obr./Fig. 8. *Dochmonota rudiventris*. Foto/Photo: P. Krásenský.

Euryalea murina (Erichson, 1839) (Obr. 9)

Bohemia centr.: Velký Osek env., NPR Libický luh (5857), 50°06'06"N 15°10'39"E, 29.IV.2013, 1 ex., prosev, M. Kocian leg., V. Assing det. (CMK).

Mediterránní druh, severně zasahující do Rakouska, Maďarska a Švýcarska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Vyskytuje se na různorodých stanovištích, často ve vlhkém detritu u vodních toků, v lesní hrabance, také v krtčích hnízdech (*Talpa europaea*) (ASSING & WUNDERLE 1997).

Nový druh pro Česko.

Geostiba lucens (G. Benick, 1970) (Obr. 10)

Moravia mer.: Pouzdřany (7065), [bez data sběru], 1 ex., Z. Fleischer leg., M. Kocian det. (MMB: coll. Z. Fleischer); dtto, 7.IV.–7.VIII.2023, 2 ex., podzemní past na stepi, Z. Kraus leg., M. Kocian det. (CJV). Málo známý, v Evropě pouze diskontinuálně rozšířený druh, známý z Rakouska, Ukrajiny a Řecka, také z více lokalit z asijské části Turecka (ASSING 2006, SCHÜLKE & SMETANA 2015).

Nový druh pro Česko.



Obr./Fig. 9. *Euryalea murina*. Foto/Photo: P. Krásenský.

Pentanota meuseli Bernhauer, 1905 (Obr. 11)

Bohemia centr.: CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Jestřebice (5553), údolí Černá díra, 29.VII.1999, 1 ex., Jar. Jelínek leg., M. Kocian det. (CMK).

Eurosibiřský druh, ve střední Evropě známý pouze z Německa a Polska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Pravděpodobně saproxylický druh s vazbou na čerstvě pokácené jehličnaté dřevo (ASSING et al. 1998).

Nový druh pro Česko.

Oxypoda doderoi Bernhauer, 1902

Moravia mer.: Židlochovice (6965), 16.V.1959, 6 ex., J. Dezort [leg.], M. Kocian det. (NMP).

Široce rozšířený druh v celé Evropě, východně zasahující do asijské části Turecka (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Ve střední Evropě je hlášený ze všech okolních států, z Rakouska, Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a Švýcarska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Z Česka jsou pouze z Čech známy velmi staré nálezy z Prahy-Krče (LOKAY 1904, FLEISCHER 1930) a z Borkovic nedaleko Veselí nad Lužnicí (ROUBAL 1934a).

Nový druh pro Moravu.



Obr./Fig. 10. *Geostiba lucens*. Foto/Photo: P. Krásenský.

***Oxypoda nigrocincta* Mulsant et Rey, 1875**

Moravia mer.: Lanžhot env., NPR Cahnov-Soutok [nyní NPR Lanžhotské pralesy] (7367), 48°39'16"N 16°56'27"E, 152 m n. m., 3.–20.V.2021, 7 ex., letová past; dtto, 20.V.–10.VI.2021, 1 ex., letová past. Všechny exempláře P. Baňar et J. Procházka leg., M. Kocian det. (CMK).

Evropský druh, ve střední Evropě známý z Rakouska, České republiky, Německa a Slovenska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Z Česka jsou pouze z Čech ohlášeny velmi staré nálezy z „Toušeně“ [nyní Lázně Toušeň] z náplavu Labe (LOKAY 1904) a z Neratovic (RAMBOUSEK 1923).

Nový druh pro Moravu.

Oxytelinae

***Bledius heterocerus* Eppelsheim, 1889 (Obr. 12)**

Moravia mer.: Valtice env., NPP Rendezvous (7266), 19.VI.2021, 1 ♂, 2 ♀♀, na UV světlo, J. Vávra leg., S. Benedikt det. (CJV: 2 ♀♀, CSB: 1 ♂).

Evropský druh, rozšířený především ve Středomoří,

východně zasahuje až do Ázerbájdžánu. Ve střední Evropě hlášený z Rakouska, České republiky, Maďarska a Slovenska (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Z našeho území je známý pouze z Moravy, hlášení typového exempláře *B. orientalis* Roubal, 1934 (nyní synonymum *B. heterocerus*) z Čech (HORION 1963) je chybné, typové exempláře *B. orientalis* pocházejí pouze ze Slovenska a Rumunska (ROUBAL 1934b). Z Moravy jsou pod jménem *B. roubali* Horion, 1963 (nyní také synonymum *B. heterocerus*) publikované pouze velmi staré nálezy z Brna, Čejče, Hodonína a Vranova u Adamova (HORION 1963).

Potvrzení výskytu druhu v Česku po více než 80 letech.

***Bledius occidentalis* Bondroit, 1907**

Bohemia bor.: Most env., Polerady (5547), 1.VIII.2019, 2 ♂♂, vyšlapávání bahnitého břehu u rybníku Kamenná voda, S. Benedikt leg. et det. (CSB). Moravia mer.: Rakvice-Trkmanský Dvůr (7167), 9.V.2008, 4 ♀♀ (CPV); dtto, 12.–13.V.2008, 1 ♂, 3 ♀♀ (CPV: 1 ♂, 2 ♀♀; CSB: 1 ♀); všechny



Obr./Fig. 11. *Pentanota meuseli*. Foto/Photo: P. Krásenský.



Obr./Fig. 12. *Bledius heterocerus*. Foto/Photo: J. Sitek.

ex. P. Vonička leg., P. Štourač det., S. Benedikt revid. Evropský druh, známý ze střední Evropy z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska, Švýcarska (STANIEC 2001, SCHÜLKE & SMETANA 2015) a nově také z Ukrajiny (GONTARENKO 2019).

Nový druh pro Česko.

Bledius unicornis (Germar, 1825) (Obr. 13)
Moravia mer.: NP Podyjí, Znojmo-Hradiště (7162), 9.VII.2024, 1 ♂, 1 ♀, na UV světlo na horní hraně svahu nad Znojemskou přehradou, J. Vávra leg. et det., S. Benedikt revid. (CJV).

Submediteránní druh, zasahující až do Zakavkazi. V Evropě je rozšířený především na pobřežích západní, jižní a jihovýchodní Evropy (SCHÜLKE & SMETANA 2015). Ve střední Evropě jen velmi lokální, z našeho území je historicky uvedený z Čech bez konkrétní lokality (FLEISCHER 1930) a z Moravy pouze starý údaj z okolí Bochoře u Přerova (HUDEČEK 1936). Ve východní části střední Evropy byl nalezen na nezasolených stanovištích, především na písčitých a hlinitých březích, v hliništích nebo na šterkovitých (JÁSZAY & HARMAN 2019).

Potvrzení výskytu druhu v Česku po 90 letech.



Obr./Fig. 13. *Bledius unicornis*. Foto/Photo: J. Sitek.

PODĚKOVÁNÍ

Za poskytnutí materiálu děkujeme Petru Baňárovi (Moravské zemské muzeum, Brno), Jiřímu Hájkovi (Národní muzeum, Praha), Pavlu Krásenskému (Chomutov), Jaroslavu Jelínkovi (Chloumek u Chocně), Zdeňku Krausovi (Mikulovice u Znojma), Pavlu Moravcovi (Litoměřice) a Pavlu Voničkovi (Severočeské muzeum, Liberec). Poděkování patří i kolegům, kteří přispěli k determinaci či revizi materiálu: †Volker Assing, Stanislav Benedikt (Plzeň), Tomáš Jászay (Bardejov), Pavel Krásenský, Pavel Moravec, †Petr Štourač a Jürgen Vogel (Görlitz). Za zhotovení fotografií patří náš dík Pavlu Krásenskému a Janu Sitkovi (Frýdek-Místek). V neposlední řadě děkujeme recenzentům Jiřímu Janákovi (Rtyně nad Bílinou) a Pavlu Krásenskému, a také členům redakční rady časopisu za přínosné připomínky k textu.

LITERATURA

- ASSING V. 2006: Thirteen new species and additional records of Eastern Mediterranean Geostiba Thomson (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae). *Linzer Biologische Beiträge* **38**: 1179–1215.
- ASSING V. 2009: On the taxonomy and zoogeography of some Palearctic Aleochara species of the subgenera Xenochara Mulsant & Rey and Rheochara Mulsant & Rey (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Beiträge zur Entomologie* **45**: 33–101.
- ASSING V. 2018a: On the Aleochara subgenera Ceranota and Xenochara. IV. A revision of types, a new species, and additional records (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Linzer Biologische Beiträge* **50**: 129–148.
- ASSING V. 2018b: Revision of the Cousya species of the West Palearctic Region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Integrative Systematics* **1**: 79–127.
- ASSING V., FRISCH J., KAHLEN M., LÖBL I., LOHSE G. A., PUTHZ V., SCHÜLKE M., TERLUTTER H., UHLIG M., VOGEL J., WILLERS J., WUNDERLE P. & ZERCHE L. 1998: 23. Familie: Staphylinidae. Pp. 119–197. In: LUCHT W. & KLAUSNITZER B. (eds): *Die Käfer Mitteleuropas. Band 15. 4. Supplementband*. Goecke & Evers, Krefeld, 398 pp.
- ASSING V. & WUNDERLE P. 1997: A revision of the species of Euryalea Mulsant & Rey, Pseudocalea Luze and Ocyota Sharp (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Entomologische Blätter* **93**: 93–126.
- BENEDIKT S. & KRÁSENSKÝ P. 2023: Doplnky k seznamu drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) Česka. (Addendum to the rove beetles list (Coleoptera: Staphylinidae) of Czechia). *Západočeské entomologické listy* **14**: 16–19. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., MANTIČ M. & VÁVRA J. CH. 2015: Nové a potvrzené druhy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Slovensko. (New and confirmed species of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for Slovakia). *Západočeské entomologické listy* **6**: 12–21. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BOHÁČ J., MATĚJČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of

- staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. *Časopis Slezského muzea Opava (A)* **56**: 227–276.
- FLEISCHER A. 1930: *Přehled brouků fauny Československé republiky*. [Review of the beetle fauna of the Czechoslovak Republic]. Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp.
- GONTARENKO A. V. 2019: Interesting records of the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Ukraine. *The Kharkov Entomological Society Gazette* **27**: 5–15.
- GUTOWSKI J. M., SUČKO K., LASOŇ A., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T., GREŇ C., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M. A., MOKRZYCKI T. & PLEWA R. 2024: *Chrzyszczce (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej*. (The beetles (Coleoptera) of the Knyszyńska forest). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 741 pp.
- HAVELKA J. & DVOŘÁK R. 1952: Poznámky k vlastivědnému výzkumu některých našich drabčků. [Notes on local history research on some of our Staphylinidae]. *Časopis Československé společnosti entomologické* **49**: 159–165.
- HORION A. 1963: *Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae. 1. Teil. Micropeplinae bis Euaesthetinae*. A. Feyel, Überlingen-Bodensee, xii + 412 pp.
- HUDEČEK L. 1936: Poznámky o broucích Přerovska a střední Moravy. (Pokračování). [Notes on beetles of the Přerov region and Central Moravia. (Continuation)]. *Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci* **49**: 140–147.
- JANUŠ J., MORAVEC P., RÉBL K. & ZÝKA M. 2022: Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko (4). Výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2020–2021. (Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve (4). Results of a faunistic survey and inventory in the years 2020 and 2021). *Elateridium* **16**: 226–322. Online: <https://www.elateridae.com/elateridium>.
- JÁSZAY T. & HARMAN M. 2019: Zaujímavé nálezy chrobákov (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae, Elmidae, Dryopidae) na Slovensku. (Interesting findings of beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae, Elmidae, Dryopidae) in Slovakia). *Biodiversity & Environment* **11**(2): 20–43. Online: <https://biodiv-enviro.fhvp.unipo.sk>.
- KLIMASZEWSKI J., GODIN B., DAVIES A., BOURDON C. & HORWOOD D. 2018: Forty new records of aleocharine beetles, and two new species in the genera Acrotoma Thomson and Atheta Thomson, for the province of Manitoba, Canada (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Insecta Mundi* **0641**: 1–33.
- KRÁSENSKÝ P. 2013: Nové a zajímavé nálezy drabčků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Českou republiku. (New and interesting records of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for the Czech Republic). *Západočeské entomologické listy* **4**: 85–88. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- LOKAY E. 1904: Fauna Bohemica. I. Noví brouci pro českou faunu. B. Příspěvek II. [I. New beetles for the Czech fauna. B. Contribution II.]. *Časopis České společnosti entomologické* **1**: 109–110.
- MANTIČ M. 2022: První nálezy drabčíka *Pediculota montandoni* v České republice a v Rakousku (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). (First findings of *Pediculota montandoni* in the Czech Republic and Austria (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae)). *Západočeské entomologické listy* **13**: 61–65. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- RAMBOUSEK F. 1923: Zajímavé nálezy drabčků (Col.). [Interesting findings of the rove beetles (Col.)]. *Časopis Československé společnosti entomologické* **20**: 132.
- ROUBAL J. 1932: Příspěvek k známostem fauny Coleopter rašeliníšť jihočeských v létě. [Contribution to the knowledge of the beetle fauna of South Bohemian peat bogs in summer]. *Časopis Československé společnosti entomologické* **29**: 25–26.
- ROUBAL J. 1934a: Die Coleopterenwelt (Tyrphobionte, Tyrphophile, Tyrphoxene etc.) der Treboner (Wittingauer) Moore. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Südböhmens). *Folia Zoologica et Hydrobiologica (Riga)* **7**: 56–97.
- ROUBAL J. 1934b: *Bledius orientalis* sp. n. *Entomologisk Tidskrift* **55**: 17–18.
- SCHMIDL J. & BUSSLER H. 2004: Ökologische Gilden xylobionter Käfer Deutschlands. Einsatz in der landschaftsökologischen Praxis – ein Bearbeitungsstandard. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **36**: 202–218.
- SCHÜLKE M. & SMETANA A. 2015: Family Staphylinidae Latreille, 1802. Pp. 304–1134. In: LÖBL I. & LÖBL D. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volumes 2/1, 2/2: Hydrophiloidea – Staphylinoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, xxvi + 1702 pp.
- STANIEC B. 2001: *Comparative morphology of the development stages of the Polish Bledius species (Coleoptera, Staphylinidae) with comments on their biology and distribution*. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 182 pp.
- ŠTOURAČ P. 2006: Drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) severní části Prahy. (Staphyliniden (Coleoptera: Staphylinidae) des Nordteiles von Prag). *Klapalekiana* **42**: 133–165.
- ŠTOURAČ P. 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 254. Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Tachyporinae, Aleocharinae. *Klapalekiana* **44**: 81–82.
- ŠTOURAČ P. 2012: Faunistic records from the Czech Republic – 341. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. *Klapalekiana* **48**: 296.
- VÁVRA J. CH. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 324. Coleoptera: Staphylinidae: Micropeplinae, Proteininae, Oxytelinae, Steninae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. *Klapalekiana* **47**: 275–278.
- VÁVRA J. CH., ŠTOURAČ P. & MANTIČ M. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 313. Coleoptera: Staphylinidae: Micropeplinae, Proteininae, Oxytelinae, Steninae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. *Klapalekiana* **47**: 105–114.
- VORST O. 2010: Staphylinidae – kortschildkevers. Pp. 66–

99. In: VORST O. (ed.): Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). *Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging* **11**: 1–317.
- ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung).

Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV **8**: 3–16.

Obdrženo do redakce: 17.12.2025

Přijato po recenzích: 28.12.2025